fresh up

Innere Medizin

Hämostaseologie, Angiologie,
Ernährungsmedizin/
Adipositas & Endokrinologie

▷ Inhalt

1. Blutungsneigung und Thromboseneigung
im klinischen Alltag
Prof. Dr. Edelgard Lindhoff-Last, Frankfurt am Main
2. Venöse Thromboembolie, Venenthrombosen
Prof. Dr. Rupert Bauersachs, Frankfurt am Main
3. Atherosklerose, Vaskulitis, Embolie, Aneurysmen u. v. m.
PD Dr. Emilia Stegemann, Kassel
4. Ernährung/Gesundheit, Epidemiologie, Therapie,
Adipositaschirurgie
Prof. Dr. Jens Aberle, Hamburg
5. Schilddrüse: Über-/Unterfunktion, Schwangerschaft,
Knoten
Prof. Dr. Jörg Bojunga, Frankfurt am Main
6. Hypophyse, Nebennieren, Endokrin bedingte
Hypertonie, Nebenschilddrüsen, Osteoporose
Prof. Dr. Jörg Bojunga, Frankfurt am Main

fresh up

Innere Medizin

▷ Impressum

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Wolfgang Fischbach, Aschaffenburg

Prof. Dr. Felix Herth, Heidelberg

Prof. Dr. Lothar Kanz, Tübingen

Prof. Dr. Bernhard Manger, Erlangen

Prof. Dr. Werner A. Scherbaum, Düsseldorf

Prof. Dr. Dr. Stephan Schirmer, Kaiserslautern

Organisation/Veranstalter

wikonect GmbH

Hagenauer Str. 53

65203 Wiesbaden

Tel.: +49 611 204809-0

freshup@wikonect.de

www.wikonect.de

Konzept

Prof. Dr. Christian Ell

Hämostaseologie

Blutungsneigung und Thromboseneigung im klinischen Alltag

Edelgard Lindhoff-Last, Frankfurt a. M.

Blutungsneigung

Ursachen für eine vermehrte Blutungsneigung

Primäre Hämostase
Thrombozytenaggregation

Sekundäre Hämostase
Fibrinbildung

Ursachen für eine vermehrte Blutungsneigung

Primäre Hämostase Thrombozytenaggregation

Sekundäre Hämostase Fibrinbildung

Erworben:
z. B. durch ASS, NSAR
Thrombozytopenien
Angeboren:
Thrombozytopathie

Luxembourg B et al., Dtsch Ärztebl. 2007; 104(21): A 1489-1498

Ursachen für eine vermehrte Blutungsneigung

Primäre Hämostase Thrombozytenaggregation

Sekundäre Hämostase Fibrinbildung

Erworben:
z. B. durch ASS, NSAR
Thrombozytopenien
Angeboren:
Thrombozytopathie

Erworben:
Antikoagulantien-
Therapie, z. B. DOAK
Angeboren:
z.B. Hämophilie A und B

Luxembourg B et al., Dtsch Ärztebl. 2007; 104(21): A 1489-1498

Ursachen für eine vermehrte Blutungsneigung

Luxembourg B et al., Dtsch Ärztebl. 2007; 104(21): A 1489-1498

Ursachen für eine vermehrte Blutungsneigung

Erworbene Störungen der primären und sekundären Hämostase sowie das angeborene von Willebrand-Syndrom sind am häufigsten Ursache von Blutungen

Luxembourg B et al., Dtsch Ärztebl. 2007; 104(21): A 1489-1498

Diagnostik primärer und sekundärer Hämostasestörungen

Sekundäre Hämostase

Diagnostik primärer und sekundärer Hämostasestörungen

Sekundäre Hämostase

Diagnostik primärer und sekundärer Hämostasestörungen

Sekundäre Hämostase

Diagnostik von Blutungen

Primäre Hämostase

Gestörte Thrombozytenadhäsion und -aggregation

Thrombozytenaggregation

Von Willebrand-Diagnostik

(von Willebrand-Antigen, von Willebrand Faktor Aktivität, Faktor VIII)

Sekundäre Hämostase

Gestörte plasmatische Gerinnung (Fibrinbildung)

TPZ, PTT, Einzelfaktoren

Das von Willebrand-Syndrom – die häufigste angeborene Gerinnungsstörung

- **Mangel an von Willebrand-Faktor**
- Bildung in Endothelzellen und Megakaryozyten
- **Prävalenz 1:100 – 1:10.000**
- **Insgesamt 6 Subtypen:**
 - Typ 1 und Typ 2: autosomal dominanter Erbgang**
 - Typ 3: autosomal rezessiver Erbgang**
- **80% der Patienten haben einen Typ 1**

Ng et al, Blood 2015; 125: 2029-2037

Das von Willebrand-Syndrom – die häufigste angeborene Gerinnungsstörung

- **Klinik: Schleimhautblutungen:**
 - Epistaxis, Zahnfleischbluten, Hämatomneigung, Nachblutung nach Zahnextraktionen**
 - Menorrhagien: Eisenmangelanämie**
- Blutungen häufig durch Traumata oder Operationen getriggert
- **Cave:**
 - Routinegerinnungsdiagnostik TPZ, PTT normal**
 - gezielte Diagnostik im Spezialgerinnungslabor erforderlich
- **Akute Phase-Protein**, intraindividuell schwankende Konzentrationen abhängig von Stress, Infektionen, Menstruationszyklus etc.
Bei Verdacht ggfb. Wiederholung der Diagnostik!

Ng et al, Blood 2015; 125: 2029-2037

Fazit für die Praxis und Klinik

- Das von **Willebrand-Syndrom** ist die **häufigste angeborene Blutungsneigung**
- **TPZ und PTT** sind meist **normal**
- Klinik: **Epistaxis, Menorrhagien und Eisenmangelanämie**
- **Spezifische Diagnostik veranlassen** bzw. bei Verdacht **Patient*in** in einem **Gerinnungszentrum** vorstellen
- **der von Willebrand-Faktor steigt im höheren Lebensalter an**, daher ist ein **mildes von Willebrand-Syndrom Typ 1 im höheren Lebensalter häufig nicht mehr klinisch relevant** (im Zweifelsfall von Willebrand-Diagnostik wiederholen!)
- **Bei auffälliger Blutungsneigung unbedingt daran denken!**
Wird im klinischen Alltag sehr häufig nicht erkannt

Erworbene Blutungsneigung unter Antikoagulation

- **30 % aller Patienten ≥ 65 Jahre** stürzen mind. **1 x/Jahr**
- die Sturzrate steigt mit dem Lebensalter und liegt in Altenheimen **> 50 %**
- in den USA werden jährlich etwa **2,5 Millionen** ältere Patienten wegen sturzbedingten Verletzungen in Notaufnahmen behandelt
- **9 % der wiederholt stürzenden alten Patienten** erhalten **Antikoagulantien**
- die Rate blutender Verletzungen ist ähnlich hoch wie bei nicht antikoagulierten Patienten (**12,8 % vs. 12,7 %**)
- die **Mortalitätsrate** liegt jedoch bei **antikoagulierten Patienten nach Stürzen** bei **21,5 % vs. 6,9 % ohne Antikoagulation ($p < 0,01$)**

Deutschlandweites Register: Auftreten schwerer Blutungen unter DOAKs im Vgl. zu Vitamin K Antagonisten – Blutungslokalisationen

Alter (Median): **79 Jahre**;
 bei **28,5% schwere Blutungen nach Stürzen**;
VKA (n=97): INR < 2,0 oder 2,0–3,0: 58,5%!

Blutungslokalisationen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Lokalisation	gesamt (n = 193)	VKA (n = 97)	DOAK (n = 96)	p-Wert* ¹
intrakraniell/intraspinal	109 (56,5 %)	64 (66,0 %)	45 (46,9 %)	0,009
intrazerebral	57 (29,5 %)	32 (33,0 %)	25 (26,0 %)	0,344
subdural	37 (19,2 %)	23 (23,7 %)	14 (14,6 %)	0,143
subarachnoidal	12 (6,2 %)	7 (7,2 %)	5 (5,2 %)	0,767
epidural	1 (0,5 %)	0 (0,0 %)	1 (1,0 %)	–
intraspinal	1 (0,5 %)	1 (1,0 %)	0 (0,0 %)	–
unbekannt	1 (0,5 %)	1 (1,0 %)	0 (0,0 %)	–
Gastrointestinaltrakt	50 (25,9 %)	19 (19,6 %)	31 (32,3 %)	0,050
oberer	40 (20,7 %)	16 (16,5 %)	24 (25,0 %)	0,159
untere	7 (3,6 %)	1 (1,0 %)	6 (6,2 %)	0,065
unbekannt	3 (1,5 %)	2 (2,1 %)	1 (1,0 %)	1,000

Lindhoff-Last et al., Dtsch Arztebl Int 2020, 117: 312-319

Deutschlandweites Register: Auftreten schwerer Blutungen unter DOAKs im Vgl. zu Vitamin K Antagonisten – Blutungslokalisationen

Alter (Median): **79 Jahre**;
 bei **28,5% schwere Blutungen nach Stürzen**;
VKA (n=97): INR < 2,0 oder 2,0–3,0: 58,5%!

Blutungslokalisationen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Lokalisation	gesamt (n = 193)	VKA (n = 97)	DOAK (n = 96)	p-Wert* ¹
intrakraniell/intraspinal	109 (56,5 %)	64 (66,0 %)	45 (46,9 %)	0,009
intrazerebral	57 (29,5 %)	32 (33,0 %)	25 (26,0 %)	0,344
subdural	37 (19,2 %)	23 (23,7 %)	14 (14,6 %)	0,143
subarachnoidal	12 (6,2 %)	7 (7,2 %)	5 (5,2 %)	0,767
epidural	1 (0,5 %)	0 (0,0 %)	1 (1,0 %)	–
intraspinal	1 (0,5 %)	1 (1,0 %)	0 (0,0 %)	–
unbekannt	1 (0,5 %)	1 (1,0 %)	0 (0,0 %)	–
Gastrointestinaltrakt	50 (25,9 %)	19 (19,6 %)	31 (32,3 %)	0,050
oberer	40 (20,7 %)	16 (16,5 %)	24 (25,0 %)	0,159
untere	7 (3,6 %)	1 (1,0 %)	6 (6,2 %)	0,065
unbekannt	3 (1,5 %)	2 (2,1 %)	1 (1,0 %)	1,000

Lindhoff-Last et al., Dtsch Arztebl Int 2020, 117: 312-319

Deutschlandweites Register: Auftreten schwerer Blutungen unter DOAKs im Vgl. zu Vitamin K Antagonisten – Blutungslokalisationen

Alter (Median): **79 Jahre**;
 bei **28,5%** schwere Blutungen nach Stürzen;
 VKA (n=97): INR < 2,0 oder 2,0–3,0: **58,5%**!

Blutungslokalisationen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Lokalisation	gesamt (n = 193)	VKA (n = 97)	DOAK (n = 96)	p-Wert* ¹
intrakraniell/intraspinal	109 (56,5%)	64 (66,0%)	45 (46,9%)	0,009
intrazerebral	57 (29,5%)	32 (33,0%)	25 (26,0%)	0,344
subdural	37 (19,2%)	23 (23,7%)	14 (14,6%)	0,143
subarachnoidal	12 (6,2%)	7 (7,2%)	5 (5,2%)	0,767
epidural	1 (0,5%)	0 (0,0%)	1 (1,0%)	-
intraspinal	1 (0,5%)	1 (1,0%)	0 (0,0%)	-
unbekannt	1 (0,5%)	1 (1,0%)	0 (0,0%)	-
Gastrointestinaltrakt	50 (25,9%)	19 (19,6%)	31 (32,3%)	0,050
oberer	40 (20,7%)	16 (16,5%)	24 (25,0%)	0,159
untere	7 (3,6%)	1 (1,0%)	6 (6,2%)	0,065
unbekannt	3 (1,5%)	2 (2,1%)	1 (1,0%)	1,000

Lindhoff-Last et al., Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 312-319

Krankenhausmortalität und Todesursachen innerhalb von 30 Tagen nach stationärer Aufnahme

	Total (n=193)	DOAK (n=96)	VKA (n=97)	p-Werte ¹ (DOAK vs VKA)
30-Tage Krankenhausmortalität (primärer Endpunkt)	25 (13,0%)	8 (8,3%)	17 (17,5%)	0,085
Blutungsassoziierte Mortalität (sekundärer Endpunkt)	19 (9,8%)	4 (4,2%)	15 (15,5%)	0,014
Andere Todesursachen*				
Respiratorische Insuffizienz	1 (0,5%)	0	1 (1,0%)	1,000
Akutes Herzversagen	2 (1,0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)	>0,20
Sepsis	2 (1,0%)	2 (2,1%)	0	>0,20
Andere	1 (0,5%)	1 (1,0%)	0	>0,20

Lindhoff-Last et al., Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 312-9. DOI: 10.3238/arztebl.2020.0312

Krankenhausmortalität und Todesursachen innerhalb von 30 Tagen nach stationärer Aufnahme

	Total (n=193)	DOAK (n=96)	VKA (n=97)	p- Werte ¹ (DOAK vs VKA)
30-Tage Krankenhausmortalität (primärer Endpunkt)	25 (13,0%)	8 (8,3%)	17 (17,5%)	0,085
Blutungsassoziierte Mortalität (sekundärer Endpunkt)	19 (9,8%)	4 (4,2%)	15 (15,5%)	0,014
Andere Todesursachen*				
Respiratorische Insuffizienz	1 (0,5%)	0	1 (1,0%)	1,000
Akutes Herzversagen	2 (1,0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)	>0,20
Sepsis	2 (1,0%)	2 (2,1%)	0	>0,20
Andere	1 (0,5%)	1 (1,0%)	0	>0,20

Lindhoff-Last et al., Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 312-9. DOI: 10.3238/arztebl.2020.0312

Krankenhausmortalität und Todesursachen innerhalb von 30 Tagen nach stationärer Aufnahme

	Total (n=193)	DOAK (n=96)	VKA (n=97)	p- Werte ¹ (DOAK vs VKA)
30-Tage Krankenhausmortalität (primärer Endpunkt)	25 (13,0%)	8 (8,3%)	17 (17,5%)	0,085
Blutungsassoziierte Mortalität (sekundärer Endpunkt)	19 (9,8%)	4 (4,2%)	15 (15,5%)	0,014
Andere Todesursachen*				
Respiratorische Insuffizienz	1 (0,5%)	0	1 (1,0%)	1,000
Akutes Herzversagen	2 (1,0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)	>0,20
Sepsis	2 (1,0%)	2 (2,1%)	0	>0,20
Andere	1 (0,5%)	1 (1,0%)	0	>0,20

Lindhoff-Last et al., Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 312-9. DOI: 10.3238/arztebl.2020.0312

Blutungen unter oraler Antikoagulation: Fazit für die Praxis

- **Intrakraniale/intraspinale Blutungen traten signifikant häufiger bei VKA-Patienten auf**
- **Gastrointestinale Blutungen wurden signifikant häufiger bei DOAK-Patienten beobachtet**
- **Die blutungsassoziierte 30-Tage in Hospital Mortalität war bei den VKA-Patienten signifikant höher als bei den DOAK-Patienten (15,5% vs 4,2%; $p=0,014$) trotz der signifikant häufigeren Gabe von PPSB bei den VKA-Patienten**

Lindhoff-Last et al., Dtsch Ärztebl Int 2020, 117: 312-319

Thromboseneigung

Pathogenese arterieller und venöser Thrombosen

Virchowsche Trias:

- Veränderung der Blutzusammensetzung
- Veränderung der Blutströmung
- Veränderung der Gefäßwand

Pathogenese arterieller und venöser Thrombosen

Virchowsche Trias:

- Veränderung der Blutzusammensetzung
- Veränderung der Blutströmung
- Veränderung der Gefäßwand

Arterieller Thrombus:
Veränderung der Gefäßwand
Thrombozytentrombus

Thrombophilie meist nicht relevant, da
Thrombozytenaggregation wesentlicher
Pathomechanismus

Pathogenese arterieller und venöser Thrombosen

Virchowsche Trias:

- Veränderung der Blutzusammensetzung
- Veränderung der Blutströmung
- Veränderung der Gefäßwand

Arterieller Thrombus:
Veränderung der Gefäßwand
Thrombozytenthrombus

Thrombophilie meist nicht relevant, da Thrombozytenaggregation wesentlicher Pathomechanismus

Venöser Thrombus:
Veränderung von Blutströmung und -zusammensetzung
Fibrinreicher Thrombus

Thrombophilie relevant, da Verstärkung der Fibrinbildung

Venöse Thromboembolien – Epidemiologie

Inzidenz in den westlichen Industrienationen

- ca 1,6 / 1000 / Jahr
- ca 2/3 tiefe Venenthrombose
ca 1/3 Lungenembolie
- Männer und Frauen gleich häufig betroffen

Venöse Thromboembolien – Epidemiologie

Inzidenz in den westlichen Industrienationen

- ca 1,6 / 1000 / Jahr
- ca 2/3 tiefe Venenthrombose
ca 1/3 Lungenembolie
- Männer und Frauen gleich häufig betroffen

Thromboserisiko:
1:100.000/Jahr

Thromboserisiko:
1:1.000/Jahr

Thromboserisiko:
1:100/Jahr

Konstantinides et al, E Heart Journal 2014; doi:10.1093

Venöse Thromboembolien – Epidemiologie

Inzidenz in den westlichen Industrienationen

- ca 1,6 / 1000 / Jahr
- ca 2/3 tiefe Venenthrombose
ca 1/3 Lungenembolie
- Männer und Frauen gleich häufig betroffen

Thromboserisiko:
1:100.000/Jahr

Thromboserisiko:
1:1.000/Jahr

Thromboserisiko:
1:100/Jahr

**70% der venösen thrombotischen Ereignisse treten
nach dem 60. Lebensjahr auf**

Konstantinides et al, E Heart Journal 2014; doi:10.1093

Familienanamnese und venöse Thromboseneigung

Sindet-Petersen et al. Plos One 2016; 11(12): e0169055

Nationales dänisches Register; Pat. mit venösen Thrombosen (VT) 1978 – 2012, **Relative Rate** von VT bei **70.767 Kindern von VT-Müttern**, **66.065 Kindern von VT-Vätern** und **29.183 Geschwistern**

Bei **Kindern von betroffenen Eltern** **2,15-fache Risikoerhöhung**

Bei betroffenen **Geschwistern** **2,6-fache Risikoerhöhung**

Familienanamnese und venöse Thromboseneigung

Sindet-Petersen et al. Plos One 2016; 11(12): e0169055

Nationales dänisches Register; Pat. mit venösen Thrombosen (VT) 1978 – 2012, **Relative Rate** von VT bei **70.767 Kindern von VT-Müttern**, **66.065 Kindern von VT-Vätern** und **29.183 Geschwistern**

Bei **Kindern von betroffenen Eltern** **2,15-fache Risikoerhöhung**

Bei betroffenen **Geschwistern** **2,6-fache Risikoerhöhung**

Die standardisierte Inzidenz-Ratio (SIR) für venöse Thrombosen nahm bei **Angehörigen 1. Grades** dann zu, wenn die **erste venöse Thrombose des betroffenen Patienten < 50 Jahre** aufgetreten war

Sibling to sibling proband 29183 23805 18977 14731 11163 8240 5892 3767 2147

Venöse Thrombose als multifaktorielles Geschehen

Evidenzbasierte Thromboseneigung

Consolidated evidence	Weak evidence	Lack of evidence
Loss-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Antithrombin deficiency • Protein S deficiency • Protein C deficiency Gain-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Factor V Leiden • Prothrombin G20210A • Non-O blood group • High levels of FVIII • Dysfibrinogenaemia • Hyperhomocysteinaemia 	<ul style="list-style-type: none"> • High TAFI plasma levels • High coagulation factor levels (fibrinogen, FIX, FXI) • EPCR polymorphisms 	<ul style="list-style-type: none"> • Plasminogen deficiency • High PAI-1 levels • FXIII leu34val • Lp(a) • MTHFR C677T and A1298C polymorphisms • Low TFPI levels • High coagulation factor levels (FV, FVII, FX) • Thrombomodulin polymorphisms • ACE polymorphisms • PZ/ZPI polymorphisms • ADAMTS13 polymorphisms

Abbreviations: MTHFR, methylenetetrahydrofolate reductase; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1; TAFI, thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor; TFPI, tissue factor pathway inhibitor; Lp(a), lipoprotein a; EPCR, endothelial protein C receptor; ACE, angiotensin-converting enzyme; ADAMTS, A Disintegrin And Metalloprotease with ThromboSpondin-1-like domains; PZ, protein Z; ZPI, protein Z-dependent protease inhibitor.

Franchini et al, *Thromb Haemost* 2016; 115: 25-30; 180: 335-345; Linnemann et al, *Haemostaseologie* 2019; 39: 49-61

Consolidated evidence	Weak evidence	Lack of evidence
Loss-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Antithrombin deficiency • Protein S deficiency • Protein C deficiency Gain-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Factor V Leiden • Prothrombin G20210A • Non-O blood group • High levels of FVIII • Dysfibrinogenaemia • Hyperhomocysteinaemia 	<ul style="list-style-type: none"> • High TAFI plasma levels • High coagulation factor levels (fibrinogen, FIX, FXI) • EPCR polymorphisms 	<ul style="list-style-type: none"> • Plasminogen deficiency • High PAI-1 levels • FXIII leu34val • Lp(a) • MTHFR C677T and A1298C polymorphisms • Low TFPI levels • High coagulation factor levels (FV, FVII, FX) • Thrombomodulin polymorphisms • ACE polymorphisms • PZ/ZPI polymorphisms • ADAMTS13 polymorphisms

Abbreviations: MTHFR, methylenetetrahydrofolate reductase; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1; TAFI, thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor; TFPI, tissue factor pathway inhibitor; Lp(a), lipoprotein a; EPCR, endothelial protein C receptor; ACE, angiotensin-converting enzyme; ADAMTS, A Disintegrin And Metalloprotease with Thrombospondin-1-like domains; PZ, protein Z; ZPI, protein Z-dependent protease inhibitor.

Franchini et al, Thromb Haemost 2016; 115: 25-30; 180: 335-345; Linnemann et al, Haemostaseologie 2019; 39: 49-61

Consolidated evidence	Weak evidence	Lack of evidence
Loss-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Antithrombin deficiency • Protein S deficiency • Protein C deficiency Gain-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Factor V Leiden • Prothrombin G20210A • Non-O blood group • High levels of FVIII • Dysfibrinogenaemia • Hyperhomocysteinaemia 	<ul style="list-style-type: none"> • High TAFI plasma levels • High coagulation factor levels (fibrinogen, FIX, FXI) • EPCR polymorphisms 	<ul style="list-style-type: none"> • Plasminogen deficiency • High PAI-1 levels • FXIII leu34val • Lp(a) • MTHFR C677T and A1298C polymorphisms • Low TFPI levels • High coagulation factor levels (FV, FVII, FX) • Thrombomodulin polymorphisms • ACE polymorphisms • PZ/ZPI polymorphisms • ADAMTS13 polymorphisms

Abbreviations: MTHFR, methylenetetrahydrofolate reductase; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1; TAFI, thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor; TFPI, tissue factor pathway inhibitor; Lp(a), lipoprotein a; EPCR, endothelial protein C receptor; ACE, angiotensin-converting enzyme; ADAMTS, A Disintegrin And Metalloprotease with Thrombospondin-1-like domains; PZ, protein Z; ZPI, protein Z-dependent protease inhibitor.

Franchini et al, Thromb Haemost 2016; 115: 25-30; 180: 335-345; Linnemann et al, Haemostaseologie 2019; 39: 49-61

Consolidated evidence	Weak evidence	Lack of evidence
Loss-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Antithrombin deficiency • Protein S deficiency • Protein C deficiency Gain-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Factor V Leiden • Prothrombin G20210A • Non-O blood group • High levels of FVIII • Dysfibrinogenaemia • Hyperhomocysteinaemia 	<ul style="list-style-type: none"> • High TAFI plasma levels • High coagulation factor levels (fibrinogen, FIX, FXI) • EPCR polymorphisms 	<ul style="list-style-type: none"> • Plasminogen deficiency • High PAI-1 levels • FXIII leu34val • Lp(a) • MTHFR C677T and A1298C polymorphisms • Low TFPI levels • High coagulation factor levels (FV, FVII, FX) • Thrombomodulin polymorphisms • ACE polymorphisms • PZ/ZPI polymorphisms • ADAMTS13 polymorphisms

Abbreviations: MTHFR, methylenetetrahydrofolate reductase; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1; TAFI, thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor; TFPI, tissue factor pathway inhibitor; Lp(a), lipoprotein a; EPCR, endothelial protein C receptor; ACE, angiotensin-converting enzyme; ADAMTS, A Disintegrin And Metalloprotease with Thrombospondin-1-like domains; PZ, protein Z; ZPI, protein Z-dependent protease inhibitor.

Franchini et al, Thromb Haemost 2016; 115: 25-30; 180: 335-345; Linnemann et al, Haemostaseologie 2019; 39: 49-61

Consolidated evidence	Weak evidence	Lack of evidence
Loss-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Antithrombin deficiency • Protein S deficiency • Protein C deficiency Gain-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Factor V Leiden • Prothrombin G20210A • Non-O blood group • High levels of FVIII • Dysfibrinogenaemia • Hyperhomocysteinaemia 	<ul style="list-style-type: none"> • High TAFI plasma levels • High coagulation factor levels (fibrinogen, FIX, FXI) • EPCR polymorphisms 	<ul style="list-style-type: none"> • Plasminogen deficiency • High PAI-1 levels • FXIII leu34val • Lp(a) • MTHFR C677T and A1298C polymorphisms • Low TFPI levels • High coagulation factor levels (FV, FVII, FX) • Thrombomodulin polymorphisms • ACE polymorphisms • PZ/ZPI polymorphisms • ADAMTS13 polymorphisms

Abbreviations: MTHFR, methylenetetrahydrofolate reductase; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1; TAFI, thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor; TFPI, tissue factor pathway inhibitor; Lp(a), lipoprotein a; EPCR, endothelial protein C receptor; ACE, angiotensin-converting enzyme; ADAMTS, A Disintegrin And Metalloprotease with Thrombospondin-1-like domains; PZ, protein Z; ZPI, protein Z-dependent protease inhibitor.

Franchini et al, Thromb Haemost 2016; 115: 25-30; 180: 335-345; Linnemann et al, Haemostaseologie 2019; 39: 49-61

Evidenzbasierte Thromboseneigung

Consolidated evidence	Weak evidence	Lack of evidence
Loss-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Antithrombin deficiency • Protein S deficiency • Protein C deficiency 	<ul style="list-style-type: none"> • High TAFI plasma levels • High coagulation factor levels (fibrinogen, FIX, FXI) • EPCR polymorphisms 	<ul style="list-style-type: none"> • Plasminogen deficiency • High PAI-1 levels • FXIII leu34val • Lp(a) • MTHFR C677T and A1298C polymorphisms • Low TFPI levels • High coagulation factor levels (FV, FVII, FX) • Thrombomodulin polymorphisms • ACE polymorphisms • PZ/ZPI polymorphisms • ADAMTS13 polymorphisms
Gain-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Factor V Leiden • Prothrombin G20210A • Non-O blood group • High levels of FVIII • Dysfibrinogenaemia • Hyperhomocysteinaemia 		

Abbreviations: MTHFR, methylenetetrahydrofolate reductase; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1; TAFI, thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor; TFPI, tissue factor pathway inhibitor; Lp(a), lipoprotein a; EPCR, endothelial protein C receptor; ACE, angiotensin-converting enzyme; ADAMTS, A Disintegrin And Metalloprotease with ThromboSpondin-1-like domains; PZ, protein Z; ZPI, protein Z-dependent protease inhibitor.

Franchini et al, Thromb Haemost 2016; 115: 25-30; 180: 335-345; Linnemann et al, Haemostaseologie 2019; 39: 49-61

Evidenzbasierte Thromboseneigung

Consolidated evidence	Weak evidence	Lack of evidence
Loss-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Antithrombin deficiency • Protein S deficiency • Protein C deficiency 	<ul style="list-style-type: none"> • High TAFI plasma levels • High coagulation factor levels (fibrinogen, FIX, FXI) • EPCR polymorphisms 	<ul style="list-style-type: none"> • Plasminogen deficiency • High PAI-1 levels • FXIII leu34val • Lp(a) • MTHFR C677T and A1298C polymorphisms • Low TFPI levels • High coagulation factor levels (FV, FVII, FX) • Thrombomodulin polymorphisms • ACE polymorphisms • PZ/ZPI polymorphisms • ADAMTS13 polymorphisms
Gain-of-function mechanisms <ul style="list-style-type: none"> • Factor V Leiden • Prothrombin G20210A • Non-O blood group • High levels of FVIII • Dysfibrinogenaemia • Hyperhomocysteinaemia 		

Abbreviations: MTHFR, methylenetetrahydrofolate reductase; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1; TAFI, thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor; TFPI, tissue factor pathway inhibitor; Lp(a), lipoprotein a; EPCR, endothelial protein C receptor; ACE, angiotensin-converting enzyme; ADAMTS, A Disintegrin And Metalloprotease with ThromboSpondin-1-like domains; PZ, protein Z; ZPI, protein Z-dependent protease inhibitor.

Franchini et al, Thromb Haemost 2016; 115: 25-30; 180: 335-345; Linnemann et al, Haemostaseologie 2019; 39: 49-61

Zusammenspiel von Gerinnungs- inhibitoren und Gerinnungsfaktoren

E. Lindhoff-Last 2017

Zusammenspiel von Gerinnungs- inhibitoren und Gerinnungsfaktoren

E. Lindhoff-Last 2017

Zusammenspiel von Gerinnungs- inhibitoren und Gerinnungsfaktoren

E. Lindhoff-Last 2017

Zusammenspiel von Gerinnungs- inhibitoren und Gerinnungsfaktoren

E. Lindhoff-Last 2017

Zusammenspiel von Gerinnungs- inhibitoren und Gerinnungsfaktoren

E. Lindhoff-Last 2017

Zusammenspiel von Gerinnungs- inhibitoren und Gerinnungsfaktoren

E. Lindhoff-Last 2017

Zusammenspiel von Gerinnungs- inhibitoren und Gerinnungsfaktoren

E. Lindhoff-Last 2017

Zusammenspiel von Gerinnungs- inhibitoren und Gerinnungsfaktoren

E. Lindhoff-Last 2017

Zusammenspiel von Gerinnungs- inhibitoren und Gerinnungsfaktoren

E. Lindhoff-Last 2017

Häufigkeit von Thrombophilien bei erstmaligem Auftreten einer venösen Thrombose

Gerinnungsstörung	Prävalenz Bevölkerung (%)	Anteil an ven. Thrombosen (%)	Absolutes jährliches Risiko (%)
Keine Thrombophilie	-	-	0,1
Het. Faktor V Leiden Mutation	5	19-40	0,7
Het. Prothrombinmutation	2-3	7-16	0,3
Hom. Faktor V Leiden Mutation	0,02	1-3	4,0
Persist. erhöhter Faktor VIII	11	25	0,5
Blutgr. A, B oder AB („non-0“)	55	75	0,2
Het. Protein C-Mangel	0,2-0,4	3-5	1,5
Het. Protein S-Mangel	0,03-0,1	2-4	0,5-1,1
Het. Antithrombin-Mangel	0,02-0,2	1,5-3	0,4-5,0
Erworben: Antiphospholipid-Syndrom	1-5	? 2-10	0,5-1,0

Lindhoff-Last E et al., Vasa. 2008; 37(1): 19-30; Manucchi et al., Thromb Haemost. 2015; 114(05): 885-889; Longo et al., N Engl J Med. 2017; 377: 1177-1187; Linnemann et al., Hämostaseologie. 2019; 39: 49-61; Rietveld et al., J Thromb. Haemost. 2019; 17: 99-109

Faktor VIII und von Willebrand-Faktor Aktivität: abhängig von Blutgruppe und Alter

**Blutgruppe 0:
Von Willebrand Faktor
25% niedriger**

Franchini et al, Thromb Haemost 2014; 112: 1103-1109

Faktor VIII und von Willebrand-Faktor Aktivität: abhängig von Blutgruppe und Alter

**Blutgruppe 0:
Von Willebrand Faktor
25% niedriger**

**Blutgruppen AB, A + B:
von Willebrand Faktor (und dadurch
indirekt Faktor VIII) vor Abbau durch
ADAMTS 13 geschützt
Dadurch 2fach erhöhtes
venöses Thromboserisiko!**

Franchini et al, Thromb Haemost 2014; 112: 1103-1109

Faktor VIII und von Willebrand-Faktor Aktivität: abhängig von Blutgruppe und Alter

Blutgruppe 0:
Von Willebrand Faktor
25% niedriger

Blutgruppen AB, A + B:
von Willebrand Faktor (und dadurch
indirekt Faktor VIII) vor Abbau durch
ADAMTS 13 geschützt
Dadurch **2fach erhöhtes**
venöses Thromboserisiko!

**Faktor VIII und von Willebrand-Faktor steigen mit dem Lebensalter an,
möglicherweise dadurch höheres Thromboserisiko im Alter**

Franchini et al, Thromb Haemost 2014; 112: 1103-1109

Prävalenzen angeborener und erworbener Thrombophilien in USA und Europa

Prävalenz einer milden venösen Thromboseneigung
in der deutschen Gesamtbevölkerung: **20%**

Prävalenz thrombophiler Neigungen
bei Patienten < 50 Jahre
mit venösen Thrombosen: **65-70%**

**ABER: in 30-35% keine Thrombophilie trotz venösen Thrombosen in
jungen Jahren nachweisbar –**

**Viele Mutationen noch unbekannt!
Daher schließt ein negatives Thrombophiliescreening eine angeborene
Thromboseneigung nicht aus**

Thrombophilie – Welche Familienangehörige sollen untersucht werden?

Retrospektive Familienkohortenuntersuchung: 2479 Familienangehörige von Patienten mit venösen Thrombosen mit Thrombophilie

Lindhoff-Last et al., Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 312-9. DOI: 10.3238/arztebl.2020.0312

Thrombophilie – Welche Familienangehörige sollen untersucht werden?

Retrospektive Familienkohortenuntersuchung: 2479 Familienangehörige von Patienten mit venösen Thrombosen mit Thrombophilie

Lindhoff-Last et al., Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 312-9. DOI: 10.3238/arztebl.2020.0312

Thrombophilie – Welche Familienangehörige sollen untersucht werden?

Retrospektive Familienkohortenuntersuchung: 2479 Familienangehörige von Patienten mit venösen Thrombosen mit Thrombophilie

Lindhoff-Last et al., Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 312-9. DOI: 10.3238/arztebl.2020.0312

Das Antiphospholipid-Syndrom (APS)

- **Antiphospholipid-Antikörper: heterogene, polyklonale, autoimmune Antikörper, die gegen Plasmaproteine mit Affinität zu anionischen Phospholipiden gerichtet sind**
- **Die Patienten entwickeln venöse und/oder arterielle antikörper-induzierte Thrombosen und/oder Schwangerschaftskomplikationen**
- **Gehäuftes Auftreten bei Autoimmunerkrankungen, z.B. systemischer Lupus erythematodes (SLE), meist erworben, in 10% familiär gehäuft**
- **Frauen/Männer (5:1)
mittleres Erkrankungsalter: 34 Jahre**

Svenungsson et al, J Intern Med 2020; 287(4): 349-372

Pathophysiologie des Antiphospholipid-Syndroms

„First HIT“:
Infektionen z.B. HIV,
Hepatitis B und C, **COVID 19**,
CMV, EBV, Bakterien,
Vakzinationen

Garcia et al, NEJM 2018; 378:2010–2021 (Abb. unten); Martirosyan et al, Front Immunol 2019; Jul 10;10:1609 (Abb. oben); Zhang et al, N Engl J Med. 2020 Apr 23;382(17):e38

Pathophysiologie des Antiphospholipid-Syndroms

„First HIT“:
Infektionen z.B. HIV,
Hepatitis B und C, **COVID 19**,
CMV, EBV, Bakterien,
Vakzinationen

Garcia et al, NEJM 2018; 378:2010–2021 (Abb. unten); Martirosyan et al, Front Immunol 2019; Jul 10;10:1609 (Abb. oben); Zhang et al, N Engl J Med. 2020 Apr 23;382(17):e38

Gerinnungstest

Gerinnungstest

Indirekter Nachweis
durch
Lupusantikoagulans-
Phänomen

Gerinnungstest

Indirekter Nachweis durch Lupusantikoagulans-Phänomen

Lupus Antikoagulans (LA)
Mind. 2 Screeningteste, bei pos. Ergebnis mind. 1 Mischtest und 2 Bestätigungsteste

Miyakis et al, JThromb Haemost 2006; 4: 295-306; Garcia et al, NEJM 2018; 378: 2010-2021

Gerinnungstest

Immunologisches Testverfahren

Indirekter Nachweis durch Lupusantikoagulans-Phänomen

Lupus Antikoagulans (LA)
Mind. 2 Screeningteste, bei pos. Ergebnis mind. 1 Mischtest und 2 Bestätigungsteste

Miyakis et al, JThromb Haemost 2006; 4: 295-306; Garcia et al, NEJM 2018; 378: 2010-2021

Labordiagnostik des Antiphospholipid-Syndroms

Miyakis et al, JThromb Haemost 2006; 4: 295-306; Garcia et al, NEJM 2018; 378: 2010-2021

Labordiagnostik des Antiphospholipid-Syndroms

Miyakis et al, JThromb Haemost 2006; 4: 295-306; Garcia et al, NEJM 2018; 378: 2010-2021

Labordiagnostik des Antiphospholipid-Syndroms

Miyakis et al, J Thromb Haemost 2006; 4: 295-306; Garcia et al, NEJM 2018; 378: 2010-2021

Definition eines Antiphospholipid-Syndroms

Persistierend positiver Test:

- Lupus anticoagulans
- Antikardiolipin IgG/IgM
- Anti- β 2-Glykoprotein I IgG/IgM

Triplet DA. Lupus 1996; McNeil HP, Miyakis et al, J Thromb Haemost 2006; Tripodi, Clin Chem 2007; 53:9: 1629-1635

Definition eines Antiphospholipid-Syndroms

Persistierend positiver Test:

- Lupus anticoagulans
- Antikardiolipin IgG/IgM
- Anti- β 2-Glykoprotein I IgG/IgM

Arterielle und/oder venöse Thrombose Schwangerschaftskomplikationen:

- >1 Abort >10. SSW
- >3 Aborte <10. SSW
- Frühgeburt <34. SSW
- Präeklampsie, Eklampsie,
Plazentainsuffizienz

Triplet DA. Lupus 1996; McNeil HP, Miyakis et al, J Thromb Haemost 2006; Tripodi, Clin Chem 2007; 53:9: 1629-1635

Definition eines Antiphospholipid-Syndroms

Persistierend positiver Test:

- Lupus anticoagulans
- Antikardiolipin IgG/IgM
- Anti- β 2-Glykoprotein I IgG/IgM

Arterielle und/oder venöse Thrombose Schwangerschaftskomplikationen:

- >1 Abort >10. SSW
- >3 Aborte <10. SSW
- Frühgeburt <34. SSW
- Präeklampsie, Eklampsie,
Plazentainsuffizienz

Mindestens
1 positiver
Test

Triplet DA. Lupus 1996; McNeil HP, Miyakis et al, J Thromb Haemost 2006; Tripodi, Clin Chem 2007; 53:9: 1629-1635

Definition eines Antiphospholipid-Syndroms

Persistierend positiver Test:

- Lupus anticoagulans
- Antikardiolipin IgG/IgM
- Anti- β 2-Glykoprotein I IgG/IgM

Mindestens
1 positiver
Test

Arterielle und/oder venöse Thrombose Schwangerschaftskomplikationen:

- >1 Abort >10. SSW
- >3 Aborte <10. SSW
- Frühgeburt <34. SSW
- Präeklampsie, Eklampsie,
Plazentainsuffizienz

Mindestens
1 klinisches
Symptom

Triplet DA. Lupus 1996; McNeil HP, Miyakis et al, J Thromb Haemost 2006; Tripodi, Clin Chem 2007; 53:9: 1629-1635

Definition eines Antiphospholipid-Syndroms

Persistierend positiver Test:

- Lupus anticoagulans
- Antikardiolipin IgG/IgM
- Anti- β 2-Glykoprotein I IgG/IgM

Mindestens
1 positiver
Test

Arterielle und/oder venöse Thrombose Schwangerschaftskomplikationen:

- >1 Abort >10. SSW
- >3 Aborte <10. SSW
- Frühgeburt <34. SSW
- Präeklampsie, Eklampsie,
Plazentainsuffizienz

Mindestens
1 klinisches
Symptom

Antiphospholipid-Syndrom

Triplet DA. Lupus 1996; McNeil HP, Miyakis et al, J Thromb Haemost 2006; Tripodi, Clin Chem 2007; 53:9: 1629-1635

Risikoprofile der Antiphospholipid-Antikörper

Risikoprofil	Laboregebnisse
Hoch	1) Dreifach positiv Lupusantikoagulantien + Anticardiolipin-Antikörper + β 2-Glykoprotein I-Antikörper 2) positive Lupusantikoagulantien mit oder ohne Antikardiolipinantikörper oder β 2-Glykoprotein I-Antikörper (einfache oder zweifache Positivität mit Lupusantikoagulantien)
Mittel	negative Lupusantikoagulantien moderate oder hohe Titer von Anticardiolipinantikörpern und/oder β2-Glykoprotein I-Antikörpern (einfache oder zweifache Positivität ohne Lupusantikoagulantien)
Niedrig	negative Lupusantikoagulantien niedrige Titer von Anticardiolipinantikörpern und/oder β2-Glykoprotein I-Antikörpern (einfache oder zweifache Positivität ohne Lupusantikoagulantien)

Modifiziert nach Bauersachs, Lindhoff-Last et al. Hämostaseologie 2019; ;39:298-300;

Arterielle und venöse Thromboembolien bei Antiphospholipid-Syndrom

Arterielle Thromboembolien

Cohen et al, *BMJ* 2010; 340:c2541 (Abb.); Ruiz-Irastorza et al, *Lancet* 2010; 376: 1498-1509

Arterielle und venöse Thromboembolien bei Antiphospholipid-Syndrom

Arterielle Thromboembolien

Venöse Thromboembolien

Cohen et al, *BMJ* 2010; 340:c2541(Abb.); Ruiz-Irastorza et al, *Lancet* 2010; 376: 1498-1509

Therapie arterieller und venöser Thrombosen bei Antiphospholipid-Syndrom – Fazit für Klinik und Praxis

* GTH: Society of Thrombosis and Haemostasis Research, DGA: German Society of Vascular Medicine, DGP: German Society of Phlebology, DGK: German Cardiac Society, BDDH: Berufsverband der Deutschen Hämostaseologen, GLVD: German League of Vascular Diseases

Severity of the antiphospholipid syndrome	DOAC treatment (use only therapeutic doses)	VKA treatment	Addition of aspirin
APS with arterial events	No use of DOACs	VKA is gold standard	Consider additional aspirin with vascular risk factors
Severe APS with triple positivity and venous thromboembolism (LA and ACA-Ab and β 2-GPI-Ab)	No use of DOACs	VKA is gold standard	Not required
Moderate APS with double antibody positivity, negative LA and venous thromboembolism (ACA-Ab and β 2-GPI-Ab)*	DOACs possible	VKA alternatively	Not required
Mild APS with single antibody positivity, negative LA and venous thromboembolism (ACA-Ab or β 2-GPI-Ab)*	DOACs possible	VKA alternatively	Not required
No APS (e.g. falsely positive LA)	DOACs	VKA alternatively	Not required

*Regular follow up (clinically and antibody testing) e.g. annually is recommended, as underlying diseases, such as systemic lupus erythematosus may develop, or antiphospholipid antibodies may diminish over time (especially low titer antibodies). DOAC: direct oral anticoagulant; VKA: vitamin K antagonist.

Bauersachs, Lindhoff-Last et al. *VASA* 2019; 48: 483-486

Therapie **arterieller** und **venöser** Thrombosen bei Antiphospholipid-Syndrom – Fazit für Klinik und Praxis

* GTH: Society of Thrombosis and Haemostasis Research, DGA: German Society of Vascular Medicine, DGP: German Society of Phlebology, DGK: German Cardiac Society, BDDH: Berufsverband der Deutschen Hämatothaseologen, GLVD: German League of Vascular Diseases

Severity of the antiphospholipid syndrome	DOAC treatment (use only therapeutic doses)	VKA treatment	Addition of aspirin
APS with arterial events	No use of DOACs	VKA is gold standard	Consider additional aspirin with vascular risk factors
Severe APS with triple positivity and venous thromboembolism (LA and ACA-Ab and β 2-GPI-Ab)	No use of DOACs	VKA is gold standard	Not required
Moderate APS with double antibody positivity, negative LA and venous thromboembolism (ACA-Ab and β 2-GPI-Ab)*	DOACs possible	VKA alternatively	Not required
Mild APS with single antibody positivity, negative LA and venous thromboembolism (ACA-Ab or β 2-GPI-Ab)*	DOACs possible	VKA alternatively	Not required
No APS (e.g. falsely positive LA)	DOACs	VKA alternatively	Not required

*Regular follow up (clinically and antibody testing) e.g. annually is recommended, as underlying diseases, such as systemic lupus erythematosus may develop, or antiphospholipid antibodies may diminish over time (especially low titer antibodies). DOAC: direct oral anticoagulant; VKA: vitamin K antagonist.

Bauersachs, Lindhoff-Last et al. VASA 2019; 48: 483-486

Therapie **arterieller** und **venöser** Thrombosen bei Antiphospholipid-Syndrom – Fazit für Klinik und Praxis

* GTH: Society of Thrombosis and Haemostasis Research, DGA: German Society of Vascular Medicine, DGP: German Society of Phlebology, DGK: German Cardiac Society, BDDH: Berufsverband der Deutschen Hämatothaseologen, GLVD: German League of Vascular Diseases

Severity of the antiphospholipid syndrome	DOAC treatment (use only therapeutic doses)	VKA treatment	Addition of aspirin
APS with arterial events	No use of DOACs	VKA is gold standard	Consider additional aspirin with vascular risk factors
Severe APS with triple positivity and venous thromboembolism (LA and ACA-Ab and β 2-GPI-Ab) or positive LA	No use of DOACs	VKA is gold standard	Not required
Moderate APS with double antibody positivity, negative LA and venous thromboembolism (ACA-Ab and β 2-GPI-Ab)*	DOACs possible	VKA alternatively	Not required
Mild APS with single antibody positivity, negative LA and venous thromboembolism (ACA-Ab or β 2-GPI-Ab)*	DOACs possible	VKA alternatively	Not required
No APS (e.g. falsely positive LA)	DOACs	VKA alternatively	Not required

*Regular follow up (clinically and antibody testing) e.g. annually is recommended, as underlying diseases, such as systemic lupus erythematosus may develop, or antiphospholipid antibodies may diminish over time (especially low titer antibodies). DOAC: direct oral anticoagulant; VKA: vitamin K antagonist.

Bauersachs, Lindhoff-Last et al. VASA 2019; 48: 483-486

Therapie arterieller und venöser Thrombosen bei Antiphospholipid-Syndrom – Fazit für Klinik und Praxis

* GTH: Society of Thrombosis and Haemostasis Research, DGA: German Society of Vascular Medicine, DGP: German Society of Phlebology, DGK: German Cardiac Society, BDDH: Berufsverband der Deutschen Hämostaseologen, GLVD: German League of Vascular Diseases

Severity of the antiphospholipid syndrome	DOAC treatment (use only therapeutic doses)	VKA treatment	Addition of aspirin
APS with arterial events	No use of DOACs	VKA is gold standard	Consider additional aspirin with vascular risk factors
Severe APS with triple positivity and venous thromboembolism (LA and ACA-Ab and β 2-GPI-Ab) or positive LA	No use of DOACs	VKA is gold standard	Not required
Moderate APS with double antibody positivity, negative LA and venous thromboembolism (ACA-Ab and β 2-GPI-Ab)*	DOACs possible	VKA alternatively	Not required
Mild APS with single antibody positivity, negative LA and venous thromboembolism (ACA-Ab or β 2-GPI-Ab)*	DOACs possible	VKA alternatively	Not required
No APS (e.g. falsely positive LA)	DOACs	VKA alternatively	Not required

*Regular follow up (clinically and antibody testing) e.g. annually is recommended, as underlying diseases, such as systemic lupus erythematosus may develop, or antiphospholipid antibodies may diminish over time (especially low titer antibodies). DOAC: direct oral anticoagulant; VKA: vitamin K antagonist.

Bauersachs, Lindhoff-Last et al. VASA 2019; 48: 483-486

Wann Thrombophilie-Screening bei venösen Thrombosen?

Modifiziert nach Linnemann et al; Hämostaseologie 2019; 39: 49-61

Thrombophilie	Akute Thrombose	Direkter FII-Inhibitor	Direkter FX-Inhibitor	Vitamin K Antagonist
Prothrombin Mutation	↔	↔	↔	↔
Faktor V Leiden Mutation	↔	↔	↔	↔
APC-Resistenz	↔	↑	↑	↔
Lupusantikoagulantien	↔	↑↑	↑↑	↑
Antithrombin (FII-Inhibitionstest)	↓	↑	↔	↔
Antithrombin (FX-Inhibitionstest)	↓	↔	↑	↔
Protein C (chromogener Test)	↓	↔	↔	↓
Protein C (Aktivitätstest)	↓	↑	↑	↓
Protein S (immunologischer Test)	↓	↔	↔	↓
Protein S (Aktivitätstest)	↓	↑	↑	↓
Gerinnungsfaktoren z.B. Faktor VIII-Aktivität	↑	↓	↓	↔

Wann Thrombophilie-Screening bei venösen Thrombosen?

Modifiziert nach Linnemann et al; Hämostaseologie 2019; 39: 49-61

Thrombophilie	Akute Thrombose	Direkter FII-Inhibitor	Direkter FX-Inhibitor	Vitamin K Antagonist
Prothrombin Mutation	↔	↔	↔	↔
Faktor V Leiden Mutation	↔	↔	↔	↔
APC-Resistenz	↔	↑	↑	↔
Lupusantikoagulantien	↔	↑↑	↑↑	↑
Antithrombin (FII-Inhibitionstest)	↓	↑	↔	↔
Antithrombin (FX-Inhibitionstest)	↓	↔	↑	↔
Protein C (chromogener Test)	↓	↔	↔	↓
Protein C (Aktivitätstest)	↓	↑	↑	↓
Protein S (immunologischer Test)	↓	↔	↔	↓
Protein S (Aktivitätstest)	↓	↑	↑	↓
Gerinnungsfaktoren z.B. Faktor VIII-Aktivität	↑	↓	↓	↔

Wann Thrombophilie-Screening bei venösen Thrombosen?

Modifiziert nach Linnemann et al; Hämostaseologie 2019; 39: 49-61

Thrombophilie	Akute Thrombose	Direkter FII-Inhibitor	Direkter FX-Inhibitor	Vitamin K Antagonist
Prothrombin Mutation	↔	↔	↔	↔
Faktor V Leiden Mutation	↔	↔	↔	↔
APC-Resistenz	↔	↑	↑	↔
Lupusantikoagulantien	↔	↑↑	↑↑	↑
Antithrombin (FII-Inhibitionstest)	↓	↑	↔	↔
Antithrombin (FX-Inhibitionstest)	↓	↔	↑	↔
Protein C (chromogener Test)	↓	↔	↔	↓
Protein C (Aktivitätstest)	↓	↑	↑	↓
Protein S (immunologischer Test)	↓	↔	↔	↓
Protein S (Aktivitätstest)	↓	↑	↑	↓
Gerinnungsfaktoren z.B. Faktor VIII-Aktivität	↑	↓	↓	↔

Wann Thrombophilie-Screening bei venösen Thrombosen?

Modifiziert nach Linnemann et al; Hämostaseologie 2019; 39: 49-61

Thrombophilie	Akute Thrombose	Direkter FII-Inhibitor	Direkter FX-Inhibitor	Vitamin K Antagonist
Prothrombin Mutation	↔	↔	↔	↔
Faktor V Leiden Mutation	↔	↔	↔	↔
APC-Resistenz	↔	↑	↑	↔
Lupusantikoagulantien	↔	↑↑	↑↑	↑
Antithrombin (FII-Inhibitionstest)	↓	↑	↔	↔
Antithrombin (FX-Inhibitionstest)	↓	↔	↑	↔
Protein C (chromogener Test)	↓	↔	↔	↓
Protein C (Aktivitätstest)	↓	↑	↑	↓
Protein S (immunologischer Test)	↓	↔	↔	↓
Protein S (Aktivitätstest)	↓	↑	↑	↓
Gerinnungsfaktoren z.B. Faktor VIII-Aktivität	↑	↓	↓	↔

Wann Thrombophilie-Screening bei venösen Thrombosen?

Modifiziert nach Linnemann et al; Hämostaseologie 2019; 39: 49-61

Thrombophilie	Akute Thrombose	Direkter FII-Inhibitor	Direkter FX-Inhibitor	Vitamin K Antagonist
Prothrombin Mutation	↔	↔	↔	↔
Faktor V Leiden Mutation	↔	↔	↔	↔
APC-Resistenz	↔	Interferenzen mit DOAKs können durch in vitro Zugabe von DOAK-Stopp (Kohletablette) verhindert werden		↔
Lupusantikoagulantien	↔			↑
Antithrombin (FII-Inhibitionstest)	↓			↔
Antithrombin (FX-Inhibitionstest)	↓			↔
Protein C (chromogener Test)	↓			↓
Protein C (Aktivitätstest)	↓			↓
Protein S (immunologischer Test)	↓			↓
Protein S (Aktivitätstest)	↓	↓	↓	
Gerinnungsfaktoren z.B. Faktor VIII-Aktivität	↑	↔	↔	

Thrombophilie: Risikoklassifikationen

Parameter	Milde Thrombophilie	Schwere Thrombophilie
Persistierend erhöhter Faktor VIII	+	
Heterozygote Faktor V-Leiden Mutation	+	
Heterozygote Prothrombinmutation	+	
Homozygote Faktor V Leiden Mutation		+
Homozygote Prothrombinmutation		+
Compound heterozygote Faktor V-Mutation /Prothrombinmutation		+
Antithrombin-Mangel		+
Protein C-Mangel		+
Protein S-Mangel		+
Antiphospholipid-Syndrom		+

Relatives und absolutes Risiko für venöse **Rezidivthrombosen**

**Absolutes Risiko einer
venösen Erstthrombose:**
0,1- 0,2% /Jahr

**Absolutes Risiko eines
Rezidivs nach 1. venöser Thrombose**
2,0 - 5,0% /Jahr (20-50fach erhöht!)

Relatives und absolutes Risiko für venöse **Rezidivthrombosen**

Absolutes Risiko einer venösen Erstthrombose: 0,1- 0,2% /Jahr

Absolutes Risiko eines Rezidivs nach 1. venöser Thrombose 2,0 - 5,0% /Jahr (20-50fach erhöht!)

Gerinnungsstörung	Relatives Risiko für Rezidive	Absolutes jährliches venöses Rezidivrisiko (%)
Venöse Thrombose in der Vorgeschichte	1	2
Faktor V Leiden (heterozygot) G1691A	1,4	2,8
Prothrombinmutante (heterozygot) G20210A	1,4	2,8
Blutgruppe A, B oder AB („non-0“)	2	4
Heterozygoter Protein C-Mangel	2,5	5
Heterozygoter Protein S-Mangel	2,5	5
Heterozygoter Antithrombin-Mangel	2,5 - 5	5 - 10
Erworben: Antiphospholipid-Syndrom	3,1 - 6,7	6,2 - 13,4

Modifiziert nach Dentali et al, Thromb Haemost 2013; 110: 1110-1111; Gandara et al, Thromb Haemost 2013; 110: 1172-1179; Weingarz et al, VASA 2015; 44: 313-323; Manucchi et al, Thromb Haemost 2015

Relatives und absolutes Risiko für venöse **Rezidivthrombosen**

Absolutes Risiko einer venösen Erstthrombose: 0,1- 0,2% /Jahr

Absolutes Risiko eines Rezidivs nach 1. venöser Thrombose 2,0 - 5,0% /Jahr (20-50fach erhöht!)

Gerinnungsstörung	Relatives Risiko für Rezidive	Absolutes jährliches venöses Rezidivrisiko (%)
Venöse Thrombose in der Vorgeschichte	1	2
Faktor V Leiden (heterozygot) G1691A	1,4	2,8
Prothrombinmutante (heterozygot) G20210A	1,4	2,8
Blutgruppe A, B oder AB („non-0“)	2	4
Heterozygoter Protein C-Mangel	2,5	5
Heterozygoter Protein S-Mangel	2,5	5
Heterozygoter Antithrombin-Mangel	2,5 - 5	5 - 10
Erworben: Antiphospholipid-Syndrom	3,1 - 6,7	6,2 - 13,4

Prolongierte Antikoagulation bereits nach der ersten Thrombose?

Modifiziert nach Dentali et al, Thromb Haemost 2013; 110: 1110-1111; Gandara et al, Thromb Haemost 2013; 110: 1172-1179; Weingarz et al, VASA 2015; 44: 313-323; Manucchi et al, Thromb Haemost 2015

Fazit für die Praxis Unsinnige Indikationen

- **Unselektioniertes Screening** aller **Familienmitglieder** von Patienten mit **milden Thrombophilieformen** wie heterozygoter Faktor-V-Leiden-Mutation
- **Unselektioniertes Screening** von **jungen Frauen vor der ersten Einnahme oraler Kontrazeptiva**
sehr niedriges absolutes Risiko venöser Thrombosen:
< 0,01 % pro Jahr
- **Unselektioniertes Screening** von Patienten mit einer **ersten venösen Thrombose im hohen Lebensalter**

Fazit für die Praxis Welche Familienangehörige sollten getestet werden?

Patienten	Therapeutische Konsequenz
Verwandte von Patienten mit venösen Thrombosen < 50. Lebensjahr + schwerer Thrombophilie (z.B. Inhibitormangel)	Heparinprophylaxe in Risikosituationen kann bei Verwandten mit Inhibitormangel risikoassoziierte Thrombosen verhindern <small>Mahmoodi et al, J Thromb Haemost 2010</small>
Junge weibliche Verwandte von Patienten mit venösen Thrombosen < 50. Lebensjahr, die eine Schwangerschaft planen	Milde Thrombophilie: Heparinprophylaxe in Risikosituationen während der Schwangerschaft + kontinuierliche Heparinbehandlung für 6 Wochen nach Entbindung Schwere Thrombophilie: kontinuierliche Heparinbehandlung während der Schwangerschaft + 6 Wochen nach Entbindung <small>Hach-Wunderle et al, VASA 2016 Gerhard et al, Blood 2016</small>

- Sinnvoll bei **venösen Thrombosen vor dem 50. Lebensjahr**
- Wiederholte venöse (**und/oder arterielle**) Thrombosen, insbesondere bei Auftreten trotz Antikoagulation (**Antiphospholipid-Syndrom?**)
- Risiko **wiederholter venöser Thrombosen** erhöht bei Patienten mit seltenen Formen der Thrombophilie:
kombinierte Thrombophilie,
angeborener Gerinnungsinhibitormangel,
homozygote Mutationen oder Antiphospholipidantikörper
- *Dann verlängerte orale Antikoagulation bereits nach der 1. venösen Thrombose erforderlich*

Angiologie

Angio-venös

Rupert Bauersachs, Frankfurt

HERZ
GEFÄSSE
RHYTHMUS

Venöse Thromboembolie

- Diagnostik
- Therapie
 - Akuttherapie
 - Dauer der Antikoagulation
- Besondere Patienten
 - Krebsassoziierte TVT

Kakkos SK, Gohel M, Baekgaard N, Bauersachs R et al. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2021

Konstantinides SV, et al. *Eur Heart J* 2020; 41: 543-603
Mazzolai L., et al *Eur J Prev Cardiol.* 2021 Jul 13. 2021/07/14.

Stevens SM, Woller SC, et al. *Chest.* 2021 Aug 2. 2021/08/06

Klinische Diagnostik

einseitige Schwellung, Schmerz, Zyanose
Wadendruckschmerz, Fußsohlendruckschmerz

Jeder klinische Verdacht auf Venenthrombose soll umgehend soweit abgeklärt werden, dass eine therapeutische Entscheidung erfolgen kann.

Cave: Anamnese und klinische Untersuchung ... haben allein eine zu geringe Sensitivität und Spezifität, um eine Thrombose zu diagnostizieren bzw. auszuschließen. Daher müssen zusätzlich andere Untersuchungsmethoden eingesetzt werden

Klinische Wahrscheinlichkeit (KW nach Wells-Score)

- Tumor
- Lähmung/Immobilisation
- Bettlägrig > 3d / größere OP
- Schmerz im Venenverlauf
- Schwellung ges. Bein
- einseitige (> 3cm) US-Schwellung
- Ödem
- Venenzeichnung
- Z.n. VTE

Alternative Diagnose: -2

Score $\geq 2 \Rightarrow$ KW hoch

2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism

Hach-Wunderle V et al., VASA 2016;45 (Suppl. 90):1-48

Günther W, 58 Jahre, Controller bei Telekom

- Vor 3 Wochen Verletzung im Bereich des rechten Knöchels
- Allmähliche Besserung, aber seit Anfang der Woche zunehmende Schwellung und Muskelkater in der rechten Wade
- 96 kg, 186 cm, Hypertonus, sonst Ø Erkrankungen

> D-Dimer 1.240 ng/ml (Norm < 500)

> Was tun am Freitag nachmittag?

1. Einweisung Klinik
2. Überweisung Angiologin
3. Bein wickeln; Kontrolle in 1-2 Tagen
4. Apixaban 5 mg 2-0-2
5. Enoxaparin 40 mg s.c. bis Diagnostik läuft

Günther W, 58 Jahre, Controller bei Telekom

- Vor 3 Wochen Verletzung im Bereich des rechten Knöchels
- Allmähliche Besserung, aber seit Anfang der Woche zunehmende Schwellung und Muskelkater in der rechten Wade
- 96 kg, 186 cm, Hypertonus, sonst Ø Erkrankung

› D-Dimer 1.240 ng/ml (Norm < 500)

› Was tun am Freitag nachmittag?

1. Einweisung Klinik
2. Überweisung Angiologin
3. Bein wickeln; Kontrolle in 1-2 Tagen
4. Apixaban 5 mg 2-0-2
5. Enoxaparin 40 mg s.c. bis Diagnostik läuft

Diagnostik Venenthrombosen

- Bildgebende Diagnostik steht nicht zur Verfügung:
- bei hoher Wahrscheinlichkeit überbrückend Antikoagulation beginnen
 - Dosis richtet sich nach klinischem Befund & Blutungsrisiko
 - Prophylaxedosis i.d.R. nicht ausreichend
 - Später muss definitiver Nachweis/ Ausschluss erfolgen
- bei niedriger Wahrscheinlichkeit kann meist bis zur Verfügbarkeit der weiteren Diagnostik (D-Dimer / Bildgebung) ohne Antikoagulation abgewartet werden.

Diagnostik Lungenemboli (instabil)

Konstantinides SV, et al: Eur Heart J 2020; 41: 543-603

Diagnostik Lungenembolie (stabil)

frühere VTE	1
HF 75-94/min	1
>95 /min	2
OP oder Fraktur < 1 Monat	1
Hämoptysen	1
aktiver Krebs	1
einseitiger Beinschmerz	1
Beinschmerzen bei tiefer Palpation oder einseitiges Ödem	1
>65 Jahre	1
Klinische Wahrscheinlichkeit	
LE unwahrscheinlich	0-2
LE wahrscheinlich	≥3

Konstantinides SV, et al: Eur Heart J 2020; 41: 543-603

Früh-Mortalität	Risikoparameter /Scores				Therapie
	Schock / Hypotension		RV↑ CT /Echo	Troponin	
Hoch > 15 %	+		+	+	Reperfusion
Intermediär 3-15 %	Intermediär-hoch	-	+	+	Reperfusion?
	Intermediär-niedrig	-	0-1 positiv		Stationär
Niedrig (≤ 1 %)	-		-	optional	Frühe Entlassung? ambulant?

Konstantinides SV, et al: Eur Heart J 2020; 41: 543-603

Empfohlene Kontrollen

In den ersten 5 - 21 Tagen

- z.B. bei Umstellung von NMH auf ein OAK (Kumarin, Dabigatran, Edoxaban) bzw.
- Dosisreduktion bei NOAK
- nach 1 Woche (Apixaban 5 mg : 2-0-2 auf 5 mg 1-0-1) bzw.
- nach 3 Wochen (Rivaroxaban 15 mg: 1-0-1 auf 20 mg 0-0-1)
- Überprüfung:
Verträglichkeit, Lokalbefund, Kompressionstherapie
- Sonographische Kontrollen i.d.R. nicht erforderlich

Hach-Wunderle V et al., VASA 2016;45(Suppl. 90):1-48

Therapie

Phasen der Therapie

Für alle Patienten (nach Möglichkeit)

Bei hohem Rezidivrisiko

Wahl des Antikoagulans (Nicht-Krebs-Patienten)

Empfehlungen 16 / 19

Für Patienten mit provozierten und unprovokierten proximalen TVT wird für die Haupt-Behandlungsphase ein DOAK empfohlen statt Behandlung mit NMH/VKA.

Akute Phase

Wenn OAK bei Patienten eingeleitet wird, bei denen eine Indikation für ein NOAK (Apixaban, Dabigatran, Edoxaban, Rivaroxaban) gegeben ist, wird NOAK empfohlen.

Auswahl: Patienten-Präferenz, ggf. auch Kosten, Applikationsweg, Monitoring-Möglichkeiten

Behandlungsphase

Für VTE empfehlen wir Apixaban, Dabigatran, Edoxaban oder Rivaroxaban vs VKA (erste 3 Mon.)

Obwohl Evidenz moderat, wählen wir eine starke Empfehlung (Sehr starke Betonung von Vermeidung eines grösseren Schadens bei vergleichbarem Benefit)

Kakkos SK, Gohel M, Baekgaard N, Bauersachs R et al: Eur J Vasc Endovasc Surg 2021

Konstantinides SV, et al: Eur Heart J 2020; 41: 543-603
Mazzolai L, et al Eur J Prev Cardiol. 2021 Jul 13; 2021/07/14.

Stevens SM, Woller SC, et al. Chest. 2021 Aug 2; 2021/08/06 in press.

NOAKs und Niere (Therapeutischer Einsatz - VTE)*

Creatinin-Clearance (ml/min)		15	20	30	30-50
Pradaxa	Dabigatran	Kontraindiziert			2x150 / 2x110 Überwachung
Xarelto*	Rivaroxaban	2x 15mg, dann 1x 20 mg oder 1x 15 mg (mit Vorsicht)			
Eliquis*	Apixaban	2x 10 mg, dann 2x 5 mg (mit Vorsicht)			
Lixiana	Edoxaban	1x30 mg			
Marcumar	Phenprocoumon	Kontraindiziert: manifeste Niereninsuffizienz			

*Dosisanpassung anders als bei Vorhofflimmern!

Stand 6/2022

Johanna U. *4.3.1991

- Sportlehrerin
- Canyoning in Bled, Slowenien
- Jetzt Beinschmerzen und Schwellung links
- V. femoralis-Thrombose links
- Pille seit 6 Monaten

This is a fictional case created by R. Bauersachs

Johanna U. *4.3.1991

- Sportlehrerin
- Canyoning in Bled, Slowenien
- Jetzt Beinschmerzen und Schwellung links
- V. femoralis-Thrombose links
- Pille seit 6 Monaten

Wie lange OAK?

- a) 3 Monate
- b) 6 Monate
- c) 1 Jahr
- d) Langfristig

Womit starten Sie?

- a) NOAK
- b) NMH
- c) NMH/VKA

Pille?

- a) Stopp
- b) Weiter

This is a fictional case created by R. Bauersachs

Evidenzbasiertes Statement 1.S4

Evidenzgrad 2-

Für Frauen mit **therapeutischer AK** nach VTE gibt es aktuell **keine Evidenz**, dass eine hormonelle Kontrazeption das **VTE-Rezidivrisiko unter fortgesetzter AK** erhöht.

Literatur: Baglin T, Bauer K, Douketis J, Buller H, Srivastava A, Johnson G. Duration of anticoagulant therapy after a first episode of an unprovoked pulmonary embolus or deep vein thrombosis: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2012;10(4):698-702.
Martinelli I, Lensing AW, Middeldorp S, Levi M, Beyer-Westendorf J, van Bellen B, et al. Recurrent venous thromboembolism and abnormal uterine bleeding with anticoagulant and hormone therapy use. Blood. 2016;127(11):1417-25.

Konsensbasierte Empfehlung 1.E7

Expertenkonsens

Da der Nutzen einer hormonellen Kontrazeption (sichere Empfängnisverhütung; Reduktion vaginaler Blutungen unter AK) das (bisher nicht belegte) Risiko übersteigt, **sollte eine bestehende hormonelle Kontrazeption für die Dauer der AK weitergeführt werden.**

.. eine **östrogenhaltige Kontrazeption soll spätestens 6 Wochen** vor Absetzen der AK **auf eine östrogenfreie Kontrazeption umgestellt werden.**

Literatur: Baglin T, Bauer K, Douketis J, Buller H, Srivastava A, Johnson G. Duration of anticoagulant therapy after a first episode of an unprovoked pulmonary embolus or deep vein thrombosis: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2012;10(4):698-702.
Martinelli I, Lensing AW, Middeldorp S, Levi M, Beyer-Westendorf J, van Bellen B, et al. Recurrent venous thromboembolism and abnormal uterine bleeding with anticoagulant and hormone therapy use. Blood. 2016;127(11):1417-25.

Stute P, Kiesel L, Bauersachs R, Beyer-Westendorf J, Bühling K. Hormonal Contraception. Guideline of the German Society of Gynecology and Obstetrics (S3-Level, AWMF Registry No. 015/015, December 2018). Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften eV (AWMF). 2019.

Horst B. *24.10.1948

- Seit letzter Woche:
Wadenschmerzen rechts,
nach Spiel mit dem Enkel
- Ultraschall:
OS-Thrombose rechts

Wie lange OAK?

- 3 Monate
- 6 Monate
- 1 Jahr
- Langfristig

This is a fictional case created by R. Bauersachs

Wie lange antikoagulieren? Wann absetzen => Rezidive?

Martinez C et al., J Thromb Haemost 2016;14:1374-1383

Problem: Wie lange Antikoagulation?

Baglin T et al., Lancet 2003;362:523-526

Problem: Wie lange Antikoagulation?

22 Baglin T et al., Lancet 2003;362:523-526

Rezidivrisiko nach unprovocierter VTE: Männliches Geschlecht

23

Baglin T et al., J Thromb Haemost 2010;8:2436-2442, Kyrle PA et al., N Engl J Med 2004;350:2558-63

Scores als Prädiktor für Blutungen

These findings do not support their use in clinical practice ...when deciding on continuing anticoagulation

de Winter et al.: A systematic review Thromb Res 2021;199:85-96
Frei AN, et al. Thromb Haemost 2021;121:1512-1522..

Anämie als Prädiktor für Blutungen

- Prospektives, nicht interventionelles VTE-Register
- Wie wirkt sich Anämie bei Einschluss und Verlauf aus?
- Hb <12 g/dl (♀)
Hb <13 g/dl (♂)

Anämie vs keine Anämie	⚠ Adjustierte* HR		
	HR	95% KI	p
Ereignis (24 Monate)			
Gesamtmortalität	1.84	1.56-2.18	<0.0001
Schwere Blutung	2.83	2.14-3.75	<0.0001
Jegliche Blutung	1.41	1.23-1.62	<0.0001
Rezidiv VTE	0.96	0.79-1.16	0.6440

Goto S, et al: Results from GARFIELD-VTE. Thromb Res 2021;203:155-162

* Adjustiert für Krebs, Alter, Rasse und BMI

Leitlinienempfehlungen zur Sekundärprophylaxe

Unbefristete Antikoagulation empfohlen (solange keine Kontraindikation)	Persistierende RF (zB aktiver Tumor, APS ^d , schwere Thrombophilie Rezidive ^a ohne Risikofaktor)
Stop nach 3(-6) Monaten^e 3 Monate	Harter, transienter RF z.B. OP, Immobilisation, Hospitalisierung, Trauma, Hormonwirkung Unterschenkel-TVT ^f	

Konstantinides SV, C, et al: Eur Heart J 2020; 41: 543-603

Leitlinienempfehlungen zur Sekundärprophylaxe

Unbefristete Antikoagulation empfohlen (solange keine Kontraindikation)	Persistierende RF (zB aktiver Tumor, APS ^d , schwere Thrombophilie Rezidive ^a ohne Risikofaktor)
Verlängerte Antikoagulation erwägen Überweisung an Spezialistin Antikoagulation mit möglichst niedrigem Blutungsrisiko	Kein /schwacher Risikofaktor • CEDE • Kleine OP (<30 min) • Akuter Krankenhausaufenthalt <3 d • Akute Bettlägrigkeit • Beinverletzung ohne Fraktur • Langstreckenflug	
Stop nach 3(-6) Monaten^e 3 Monate	Harter, transienter RF z.B. OP, Immobilisation, Hospitalisierung, Trauma, Hormonwirkung Unterschenkel-TVT ^f	

Konstantinides SV, C, et al: Eur Heart J 2020; 41: 543-603

Langzeittherapie der VTE mit Apixaban AMPLIFY-EXT Studie

N=2.486

VTE-Patienten
nach 6- bis 12-
Monaten OAK

Adaptiert aus Agnelli G et al. *N Engl J Med.* 2013;368(8):699-708

Meta-Analyse: Reduzierte DOAK-Dosis in der verlängerten Sekundärprophylaxe

Rezidiv VTE

Reduzierte Dosis vs volle Antikoagulation

Study or Subgroup	Reduced dose DOAC		Full dose anticoagulation		Weight	Risk Ratio
	Events	Total	Events	Total		
Amplify-EXT 2013	14	840	14	813	48.8%	0.97 [0.46, 2.02]
Einstein CHOICE 2017	13	1127	17	1107	51.2%	0.75 [0.37, 1.54]
Total (95% CI)		1967		1920	100.0%	0.85 [0.51, 1.42]
Total events	27		31			
Heterogeneity: Tau ² = 0.00; Chi ² = 0.23, df = 1 (P = 0.63); I ² = 0%						
Test for overall effect: Z = 0.62 (P = 0.54)

0.85 (0.51-1.42)

Herold J, Bauersachs R. *J Thromb Haemost.* 2021 Sep;19(9):2357-8. 2021/08/2
Vasanthamohan L, Boonyawat K et al. *J Thromb Haemost.* 2021 Sep;19(9):2359-60. 2021/08/27.

Meta-Analyse: Reduzierte DOAK-Dosis in der verlängerten Sekundärprophylaxe

Rezidiv VTE

Reduzierte Dosis vs *volle* Antikoagulation

Schwere und nicht-schwere Blutungen

0.85 (0.51-1.42)

Reduzierte Dosis vs *keine* Antikoagulation

Herold J, Bauersachs R. *J Thromb Haemost.* 2021 Sep;19(9):2357-8.2021/08/2
Vasanthamohan L, Boonyawat K et al. *J Thromb Haemost.* 2021 Sep;19(9):2359-60.2021/08/27.

Leitlinienempfehlungen zur Sekundärprophylaxe

Unbefristete Antikoagulation
(solange keine Kontraindikation)

Persistierende Risikofaktoren
(z.B. aktiver Tumor, APS^d, schwere Thrombophilie, Rezidive^a ohne Risikofaktor)

Wenn verlängerte Antikoagulation, dann

- Apixaban 2 x 2,5 mg oder
- Rivaroxaban 1 x 10 mg nach 6 Monaten AK erwägen (IIa A)

Stopp nach 3 (- 6) Monaten^e

Harter, transienter Risikofaktor
z.B. OP, Immobilisation, Hospitalisierung, Trauma, Hormonwirkung

3 Monate

Unterschenkel-TVT^f

Konstantinides SV, C, et al: *Eur Heart J* 2020; 41: 543-603

Kompression

- Frühe Kompression (30–40 mmHg) (Kompressionsverband oder -Strümpfe) < 24 h empfohlen (1A)
- Proximale TVT: US-Kompressionsstrümpfe erwägen (IIaA)
- Proximale TVT und begrenzte Symptome und Befunden => 6–12 Monate Dauer (1A)

Kakkos SK, Gohel M, Baekgaard N, Bauersachs R et al: Eur J Vasc Endovasc Surg 2021

Mazzolai L, Ageno W, Alatri A, Bauersachs R, et al Eur J Prev Cardiol. 2021 Jul 13. 2021/07/14.

Tumorassoziierte Thrombosen

Tumorassoziierte Thrombosen – Das unterschätzte Risiko

KREBS-PATIENTEN

■ Venöse TE

Tumor

Malignancy and thrombosis:
a double-sided clinical relationship

VTE

■ Krebsassoziiert

ALLE VTE

Luxembourg B, Bauersachs R: Malignancy and thrombosis: A double-sided clinical relationship VASA 2005; 34:225-234
Ay C. et al., Thromb Haemost. 2017;117(2):219-230; Grilz E. GTH 2018 (P118)

Tumorassoziierte Thrombosen – Das unterschätzte Risiko

KREBS-PATIENTEN

■ Venöse TE

Tumor

Malignancy and thrombosis:
a double-sided clinical relationship

- 20% bekommen eine VTE
- VTE erstes Tumor-Zeichen
- VTE- Prophylaxe und Therapie weniger effektiv

■ Krebsassoziiert

ALLE VTE

- 20% aller VTE = Tumorpat.
- VTE: führende Todesursache
- 50% VTE bei der Autopsie
- VTE: schlechtere Prognose

Luxembourg B, Bauersachs R: Malignancy and thrombosis: A double-sided clinical relationship VASA 2005; 34:225-234
Ay C. et al., Thromb Haemost. 2017;117(2):219-230; Grilz E. GTH 2018 (P118)

VTE Inzidenz bei verschiedenen Krebsarten

Cohen AT et al, *Thromb Haemost* 2017;117:57-65
UK Clinical Practice Research Datalink, with additional information on hospitalisation and cause of death, between 2001 and 2011

Chest Guidelines 2021: Empfehlungen zur Antikoagulation mit DOAKs bei CAT

- Bei CAT („krebssassoziierter Thrombose“) wird ein oraler Faktor Xa-Inhibitor (**Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban**) gegenüber NMH empfohlen (starke Empfehlung, Evidenz von mittlerer Sicherheit).
- **Edoxaban und Rivaroxaban** scheinen bei CAT und luminaler GI- Malignität mit einem höheren Risiko für schwere GI-Blutungen als NMH verbunden zu sein, **Apixaban** hingegen nicht.
- **Apixaban oder NMH** können bei Patienten mit luminalen GI-Malignomen die bevorzugte Option sein.

Stevens SM et al; *Chest online* 2021 August 02; doi.org/10.1016/j.chest.2021.07.056

Wahl des Antikoagulans bei Krebs

NMH	Instabil Hohes Blutungsrisiko	<p>Akute Leukämien Gastrointestinale Läsion, v. a. nicht reseziert CrCl < 30 ml/min</p> <p>Cerebral: primär und Metastasen</p>	<p>Stark reduzierter Status akute Chemotherapie Sepsis, Erbrechen, Mukositis Thrombos < 50.000 Post-OP < 2 Wochen Wechselwirkungen erwartet</p>
	DOAK	Stabil Niedriges Blutungsrisiko	<p>Pankreas Leber- /Nierenzell-Ca Prostata Schilddrüsen Lunge, Ovarial CLL, CML Cervix, Mamma Melanom</p>

Angiologie – arteriell

**Atherosklerose, Vaskulitis
Embolie, Aneurysmen
Akutes Aortensyndrom, Kompressionssyndrome**

Emilia Stegemann, Kassel und Marburg

Atherosklerose

Atherosklerose

- Risikofaktoren
- chronisch/akut

Wang T: Pathogenesis of Atherosclerosis 2017

Atherosklerose

- LDL-Ablagerungen in der Gefäßwand
- Inflammatorische Prozesse: Schaumzellen
- Ausbildung einer fibrösen Kappe
- Ausdünnung der fibrösen Kappe (instabiler Plaque) mit Ruptur
- Thrombusapposition auf der Rupturstelle mit konsekutivem Verschluss der Arterie
- Alternativ: Umbau des Plaques mit sekundärer Kalzifizierung

Wang T: Pathogenesis of Atherosclerosis 2017

Wang T: Pathogenesis of Atherosclerosis 2017

Gefäßregionen Atherosklerose

- Kraniell (extrakraniell, intrakraniell)
- Periphere Arterien (Arme, Beine)
- Aorta
- Koronararterien
- Aortenabgänge (Viszeral-, Nieren-, Lumbalarterien)

Diagnostik

- In den meisten Fällen reicht (erst einmal):
 - Anamnese
 - Körperliche Untersuchung (Pulse tasten, Auskultation)
 - Ultraschall

Diagnostik

- In den meisten Fällen reicht (erst)
 - Anamnese
 - Körperliche Untersuchung
 - Ultraschall (Dopplersonographie)

**Therapieziel nicht aus den Augen verlieren
Kritische Situationen erkennen!**

Diagnostik der PAVK der Beine

- Informationen über Schweregrad der Erkrankung über die Klinik (Fontaine-Stadien) und Messung der peripheren Durchblutung
- Stufendiagnostik
 - Körperliche Untersuchung
 - ABI/KAI-Bestimmung
 - Duplex
 - Ggf weitere Bildgebung (nur wenn nicht aussagekräftig)

AnkleBrachialIndex/**K**nöchel**A**rmIndex

© ESC 2017

Ultraschall bei Atherosklerose

Ultraschall bei Atherosklerose

Bestimmung der PSV-Ratio

Therapie

- Stadium I und II: Gehtraining, TAH, Statin, Kontrolle der Risikofaktoren
 - Überleben nach 5 Jahren ca 75%
- Stadium III und IV: Revaskularisieren zur Vermeidung einer Amputation
 - Überleben nach 1 Jahr ca 75%

Therapie

- Stadium I und II: Gehtraining, TAI, Behandlung der Risikofaktoren
 - Überleben nach 1 Jahr ca. 80%
- Stadium III (Ruheschmerz) und Stadium IV (Nekrose/Gangrän) sind kritisch
 - Amputationen zur Vermeidung einer Amputation
 - Überleben nach 1 Jahr ca. 75%

Zusammenfassung Atherosklerose

Vaskulitis

Vaskulitis

Jennette JC 2013

Vaskulitis der großen Gefäße (RZA – TA)

- Hauptunterscheidungsmerkmale:
 - Alter der Patienten
 - Lokalisation der Arteriitis
- systemische Vaskulitis, immunvermittelt (dendritische Zellen, Makrophagen, T-Lymphozyten)
- VZV-Reaktivierung?
- TA Diskussion genetische Disposition (HLA-B 52 bzw HLA-B 51)

Vaskulitis der großen Gefäße

- Hauptunterscheidungsmerkmale:
 - Alter der Patienten
 - Lokalisation
- systemische Vaskulitis, immunvermittelt (dendritische Zellen, Makrophagen, T-Lymphozyten)
- VZV-Reaktivierung?
- TA Diskussion genetische Disposition (HLA-B 52 bzw HLA-B 51)

Selten!
Bei Patienten ohne Risikofaktoren mit Progredienten Durchblutungsstörungen dran denken

Diagnostik der Großgefäßvaskulitis

- Klinik (Achtung unspezifisch: man muss dran denken!)
- Labor (BB, CRP, BSG)
- Ultraschall
- Ggf PET-CT
- Biopsie nur noch in Ausnahmefällen

*Quinn EM: Ann Vasc Surg 2012; 26: 649-654, Dejaco C: Ann Rheum Dis 2018; 77: 636-643
Diamantopoulos AP: Arthritis Care Res 2014; 66: 113-119, Lottspeich C: Ultraschall Med 2019; 40: 638-645*

Beispiele

Therapie

- Immunsuppression (Prednisolon, Tocilizumab, MTX)
- Therapie ausreichend lange
- Lebenslange Kontrolle auf Komplikationen (Ausbildung von Aneurysmen)

Fallbeispiel

- Patientin, 63 Jahre, Vorstellung wegen belastungsabhängiger Schmerzen im Bereich der rechten Wade
- Symptomatik seit etwa zwei Jahren. Aktuell schmerzfreie Gehstrecke in der Ebene ca 100m. Kein Ruheschmerz, keine Sensibilitätsstörungen.
- Orthopädische Vorstellung erfolgt. Infiltration lumbal ohne wesentlich Befundänderung. Verordnung von Schmerzmitteln. Aktuell Hydromorphon 4mg 2x tgl

Differentialdiagnose Beinschmerz

- vaskulär
- muskuloskelettal
- neurologisch

Diagnostik

Diagnostik

Untersuchungs-Text

Laufbandergometrie 12% Steigung, 3.2 km/h: Beginn der Beschwerden nach 60m rechte Wade, Abbruch nach 90 m wg. Beschwerden im Beckenbereich.

A. axillaris, A. vertebralis

Arterielle Embolie

Embolie

- Materialverschleppung in die Peripherie mit (Teil-)Okklusion der peripheren Strombahn
- Meist **akutes** Ereignis

Emboliequellen:

- Kardial
- Große Gefäße (Aneurysmen)
- Paradoxe Embolie

Akut bedeutet...

Klinische Untersuchung

- **Durchblutung**
- **Motorik**
- **Sensibilität**

Diagnostik

- Vergleichbar der PAVK

Diagnostik

- Vergleichbar der PAVK
- Ultraschall mit „Längsbewegung“ der Arterien

Therapie

- Je nach Dauer der Ischämie („time is Bein“)
 - Nach Möglichkeit Revaskularisieren (interventionell/operativ)
 - In der Regel Lysetherapie und im weiteren Verlauf PTA/OP
- Emboliequelle suchen und ggf beseitigen

Emboliequelle Aneurysma

Aneurysma

- Irreversible Aufweitung der Gefäßwand häufig auf Grundlage einer Atherosklerose
- Seltener bei Bindegewebserkrankungen, dann häufiger Dissektionen
- Arten: verum, dissecans, spurium
- Formen: fusiform, sacciform

Klinik

- Meist erst durch Komplikationen symptomatisch (Embolie, Verschluss, Ruptur, Dissektion)
- Screening auf Bauchaortenaneurysma inzwischen Kassenleistung. (Nur für Männer)

Klinik

- Meist erst durch Komplikationen symptomatisch (Embolie, Verschluss, Ruptur, Dissektion)
- Screening auf Bauchaortenaneurysma inzwischen Kassenleistung. (Nur für Männer)

Bei jungen Patienten mit peripheren Embolien nach proximalen Aneurysmen suchen

Lokalisationen

- Aorta
- Iliakalarterien
- Poplitealarterien

- Hirnarterien
- Viszeralarterien

Beispiele

Therapie

- TAH, Statin, Blutdruckeinstellung, Nikotinstop
- Je nach Klinik und Größe operative Therapie: offen oder endovaskulär

E ndo
V askulärer
A orten
R epair

Nicht erschrecken, wenn Ihnen so etwas über den Weg läuft...

Nicht erschrecken, wenn Ihnen so etwas über den Weg läuft...

Akutes Aortensyndrom

Wichtige Komplikation des Aortenaneurysmas

Akutes Aortensyndrom

- **Aortendissektion** (im engeren Sinn): Aufspaltung der Wandschichten durch Einriss in die Intima (Entry) und konsekutiv Ausdehnung in Längsrichtung unter Entstehung eines falschen Lumens, ggf Reentry
 - In der Klinik Einteilung nach Stanford A und B
- Penetrierendes Aortenulcus (**PAU**)
- **Intramurales Hämatom**

Therapie

- Wenn Aorta ascendens betroffen, dann SCHNELL
 - Gefahr einer Beteiligung der Koronarien, der Karotiden, Hämoperikard...
- operativ

Therapie

- Wenn Aorta ascendens betroffen, dann SCHNELL
 - Gefahr einer Beteiligung der Koronarien, der Karotiden, Hämoperikard...
- operativ

ACHTUNG!
Typ A Dissektionen haben eine hohe Sterblichkeit
Sofortige Operation!

Kompressionssyndrome

Arterielle Kompressionssyndrome

- Passagere (provozierbare) oder permanente Kompression (vaskulärer) Strukturen
 - physiologische Engen
 - Pathologien der umgebenden Strukturen (Verstärker)
 - Gefäßkompressionen durch Muskeln und Bänder bei Fehlbelastungen oder Muskelhypertrophie

Unterscheidung Syndrom/Phänomen

- dauerhafte oder immer wieder kehrende Kompression der Gefäßwände
→ **morphologische Veränderungen**
- intermittierend oder permanent turbulenter Fluss hinter der Stenose
 - Konsekutiv HINTER der Stenose Erweiterung („Spindel“, Aneurysma)
 - Durch den verlangsamten Blutfluss hinter der Stenose Ausbildung von Thromben (mit peripheren Embolien)

Lokalisationen

- Obere Thoraxapertur (Thoracic-Outlet-Syndrome)
- Kompression des Truncus coeliacus (Dunbar-Syndrom)
- Popliteales Entrapment

Lokalisationen

- Obere Thorax (Mittelschlag-Syndrome)
- Komplex (Dunbar-Syndrom)
- ...

**ACHTUNG:
SELTEN!**

Lokalisationen

- Obere Thorax (Mittelschlag-Syndrome)
- Komplex (Dunbar-Syndrom)
- ...

**ACHTUNG:
SELTEN!**

**Bei arteriellen Embolien bei jungen Patienten
aber immer daran denken**

Beispiel TOS

Beispiel TOS

Beispiel Popliteales Entrapment

Therapie

- Operativ
- Bei Kompressionssyndromen nie interventionell!!!!

Ernährungsmedizin/Adipositas

Ernährung und Gesundheit, Epidemiologie der Adipositas, Versorgungssituation in Deutschland, konservative Therapie der Adipositas, Adipositaschirurgie

Jens Aberle, Hamburg

Basiswissen Adipositas

Definition und Kriterien nach WHO 2000

Gewichtsklassifikation bei Erwachsenen anhand des BMI

Kategorie	BMI	Risiko für Begleiterkrankungen des Übergewichts
Untergewicht	< 18	niedrig
Normalgewicht	18,5 – 24,9	durchschnittlich
Übergewicht	≥ 25,0	
Präadipositas	25 – 29,9	gering erhöht
Adipositas Grad I	30 – 34,9	erhöht
Adipositas Grad II	35 – 39,9	hoch
Adipositas Grad III	≥ 40	sehr hoch

Zusatzkriterien Fettverteilungsmuster, Taillenumfang

Bei Personen mit BMI $\geq 25 \text{ kg/m}^2$ sollte stets Taillenumfang gemessen werden. Bei Männern ≥ 102 und bei Frauen ≥ 88 liegt eine abdominelle Adipositas vor

Taillenumfang und Risiko für Adipositas-assoziierte Komplikationen*

Risiko für metabolische und Kardiovaskuläre Erkrankungen	Taillenumfang (in cm)	
	Männer	Frauen
erhöht	≥ 94	≥ 80
deutlich erhöht	≥ 102	≥ 88

Lean et al. 1995

Häufige Folgeerkrankungen

Pathophysiologischer Zusammenhang zwischen Exzess von Fettgewebe und Folgeerkrankungen

Heymsfield SB, Wadden TA. NEJM 2017;376:254-66

BMI und Mortalität

HUNT und UK Biobank studies

Sun et al. BMJ 2019; 364:11042

Epidemiologie

Adipositas hat sich seit 1970ern fast verdreifacht

Adipositas-Prävalenz Erwachsene in Deutschland (altersadjustiert)

NCD Risk Collaboration, Lancet 2017, 390:2627-2642, Online: <http://ncdrisc.org/data-downloads.html>, Zugriff: 20.10.2019.

Anzahl Betroffene in Deutschland (18–79 Jahre)

Nach BMI¹

Adipositas
(BMI ≥ 30)
15 Mio.

Adipositas Grad II + III
(BMI ≥ 35)
4,2 Mio.

Nach BMI + Taillenumfang/WHR¹

Adipositas + abdominale Adipositas
(BMI ≥ 30 sowie Taillenumfang ≥ 88 cm bzw. 102 cm)
13,7 Mio.

Adipositas + stark erhöhte WHR
(BMI ≥ 30 sowie WHR Frauen ≥ 0,85; Männer ≥ 1,0)
9,5 Mio.

Nach BMI + Begleiterkrankungen²

Adipositas + Prädiabetes
(BMI ≥ 30 sowie HbA_{1c} ≥ 39–47 mmol/mol)
4,2 Mio.

Adipositas + T2DM (bekannt oder unbekannt)
(BMI ≥ 30 sowie HbA_{1c} ≥ 48 mmol/mol)
3,2 Mio.

1: Berechnung des RKI auf Anfrage der DAG auf Basis von RKI, DEGS1, 2008–11; 2: Berechnung des RKI auf Anfrage der DAG auf Basis von RKI, DEGS1, 2008–11 und Heidemann et al. (2015)

Pandemie hat Gewichtszunahme beschleunigt

- Kinder und Jugendliche (CrescNet)

- Erwachsene (RKI GEDA)

Journal of Health Monitoring · 2020 5(4) DOI 10.25646/7171.2 Robert Koch-Institut, Berlin; Vogel M et al. Gewichtszunahme bei Kindern. Adipositas 2021; 15: 206–211

Gewichtskontrolle und körperliche Aktivität zur Reduktion des Risikos für Folgeerkrankungen

Frühe Behandlung verhindert Ko-Morbiditäten

Lingvay I et al. Lancet. 2022;399:394-405

Senkung des Diabetes-Risikos

Hu et al., N Engl J Med 2001; 345:790-797

Prävention des Diabetes durch Gewichtsreduktion

Diabetes Prevention Program (DPP) 10 Jahres Daten

Gewichtsveränderung

Kumulative Diabetesinzidenz

DPP Research Group, Lancet 2009; 374:77-86

Studien zur Assoziation zwischen Gewichtsreduktion und Verbesserung Adipositas assoziierter Folgeerkrankungen

*Figure displays weight loss ranges examined in the studies (impact of >10% weight on NAFLD, and sleep apnoea symptoms was not reported). BP, blood pressure; TG, triglycerides; GERD, gastroesophageal reflux disease; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; PCOS, polycystic ovary syndrome; TG, triglycerides

Cefalu et al. Diabetes Care 2015;38:1567-82; Lean et al. Lancet 2018;391:541-51

Look Ahead Studie –
Effekt der Gewichtsreduktion
nach 1 Jahr

Wing RR et al, Diab Care 2011

Lebensstilintervention bei Typ-2-Diabetes

Look AHEAD – Studie
Änderung des HbA1c

Look AHEAD Research Group. *N Engl J Med* 2013; 369:145-154

Therapie der Adipositas

Therapie der Adipositas Behandlungsalgorithmus

Ärztliche
Notwendigkeitsbescheinigung einer
ernährungstherapeutischen
Beratung nach § 43 Satz 1 Nr. 2 SGB V
„Ergänzende Leistungen zur
Rehabilitation“
 („Regelleistungen, welche nach
pflichtgemäßem Ermessen erbracht
werden müssen“)

Basistherapie der Adipositas

95 % der Menschen mit Adipositas schaffen es
nicht,
ihr Körpergewicht längerfristig um $\geq 10\%$
reduzieren

Caterson ID, et al.. *Diabetes Obes Metab.* 2019;21:1914–1924. <https://doi.org/10.1111/dom.13752>

Diätkonzepte zur Gewichtsreduktion low fat – low carb – mediterran im Vergleich

N= 322
BMI: 31 kg/qm
Gewicht: 91 kg

Shai I et al., *N Engl J Med*. 2016

Diätetische Therapien über 2 Jahre Identischer Verlauf trotz unterschiedlicher Makronährstoff-Anteile

n=811
BMI: 33 kg/m²
Gewicht: 94 kg

Sacks FM et al, *NEJM* 2009

Remission eines T2DM durch Lebensstil Intervention

50 € amazon Gutschein

850 kcal für 3 Monate

"food re-introduction"

15000 Schritte/d

Lancet 2017 Dec 4, pii: S0140-6736(17)33102-1

Lean MEJ et al. Lancet 2018, 391: 541-551

Bausteine der Adipositas-Therapie (Erwachsene)

Basistherapie

Ernährung

Bewegung

Verhalten

Begleitend: DiGAs*

BMI ≥ 30 kg/m² oder
BMI 25 < 35 kg/m² +
Begleiterkrankungen

Arzneimitteltherapie

Orlistat

Liraglutid 3.0 mg

Semaglutid 2.4 mg

BMI ≥ 30 kg/m² oder
BMI ≥ 28 kg/m² +
Begleiterkrankungen

Chirurgie

Biliopankreatische
Diversion

Magenbypass

Magenband

Schlauchmagen

BMI ≥ 40 kg/m² oder
BMI ≥ 35 kg/m² +
Begleiterkrankungen

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in der Gesundheitsversorgung

- Seit Oktober 2020 können Ärztinnen/Ärzte Apps auf Rezept verschreiben
- Deutschland ist das erste Land, das digitale Gesundheitsanwendungen („DiGAs“) über die gesetzliche Krankenversicherung anbietet
- Die Verordnung erfolgt pro Quartal, Versicherte erhalten auch über ihre KK direkten Zugang zur App

12-monatige Studie bestätigt Wirksamkeit

Die Wirksamkeit von zanadio wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig in einer unabhängigen 12-monatigen klinischen Studie nachgewiesen. Insgesamt nahmen 150 erwachsene Personen mit einem BMI zwischen 30 und 40 kg/m² an der Studie teil.

Zu Beginn wurden die Teilnehmerinnen nach dem Zufallsprinzip in eine Interventions- und eine Kontrollgruppe aufgeteilt. Die Interventionsgruppe nutzte zanadio, die Kontrollgruppe erhielt keine Behandlung, konnte aber – wenn gewünscht – andere Methoden zur Gewichtsreduktion nutzen (Versorgungsrealität).

<https://zanadio.de/studienergebnisse/>

DiGA bei der Indikation Adipositas & Komorbidität

Endpunkt: Gewichtsreduktion

Patienten mit BMI > 40
oder > 40 mit
Komorbidität

Huntriss Ret al, Clin Obes 2022

Medikamentöse Therapie

Medikamentöse Adipositas-Therapie zugelassene Präparate in Deutschland

Wegovi®
(Semaglutid
2,4mg)

Saxenda®
(Liraglutid)

Orlistat®

Xenical®

Imcivree®
(Setmelatoni
de)

Veränderung des Körpergewichts (%) unter Liraglutid 0-172 Wochen

Mittl. Gewicht zu Beginn: 108 kg

Fujioka et al. Endocrine Society 2016, 1-4 April 2016, Abstract 24365

Unerwünschte Ereignisse unter Liraglutid 0-162 Wochen

	Liraglutid 3,0 mg		Placebo	
	%	R	%	R
Übelkeit	40,9	29,9	16,7	11,3
Nasopharyngitis	26,4	23,5	28,0	27,5
Diarrhö	25,2	19,0	14,3	9,9
Obstipation	22,1	13,0	11,4	6,8
Erbrechen	19,7	14,7	5,4	3,6
Kopfschmerzen	18,0	13,3	16,3	14,9
Infektion der oberen Atemwege	15,7	12,1	15,9	14,4
Rückenschmerzen	13,3	8,9	16,1	11,0
Arthralgie	12,3	7,1	13,0	9,2
Influenza	12,1	7,8	10,6	8,3
Verminderter Appetit	10,9	5,5	3,5	1,8
Dyspepsie	10,3	6,0	4,7	2,7
Müdigkeit	10,1	5,8	7,6	4,5
Schwindel	9,7	6,1	7,2	4,9
Lipase-Anstieg	9,7	6,5	3,1	1,7

Sicherheitspopulation. %, Anteil der Patienten, der ≥ 1 Episode berichtet; R, Ereignisrate auf 100 Jahre Beobachtung

Fujioka et al. Endocrine Society 2016, 1-4 April 2016, Abstract 24365

Adipositastherapie: Semaglutid im Vgl. zu Plazebo (Step 1 Studie)

A Body Weight Change from Baseline by Week, Observed In-Trial Data

JPH Wilding et al. N Engl J Med. 2021 Feb 10. doi: 10.1056/NEJMoa2032183.

Adipositastherapie: STEP 8 Studie (über 28 Wochen) Semaglutid 2,4 mg vs. Placebo vs. Liraglutid 3,0 mg

Rubino DM et al. JAMA 2022; 327: 138-150

Medikamentöse Therapie – Fazit und Perspektive

- Die GLP1-Rezeptoragonisten **Liraglutid** und **Semaglutid** sind die bisher wirklich wirksamen und bezüglich des Nebenwirkungsprofils vertretbaren Medikamente zur Gewichtsreduktion.
- Nach Absetzen dieser Medikamente kommt es leider wieder zur Gewichtszunahme
- Der noch nicht auf dem Markt verfügbare duale GIP-/GLP1-Rezeptoragonist **Tirzepatid** übertrifft die Wirksamkeit von Semaglutid 2,4 mg bei ähnlichem Nebenwirkungsprofil

Adipositas – Chirurgie

1. Patienten mit BMI > 40 Kg/m² ohne Begleiterkrankungen nach Erschöpfung der konservativen Therapie
2. Patienten mit BMI > 35 kg/m² mit einer oder mehreren assoziierten Begleiterkrankungen (z.B. Typ-2-Diabetes, KHK, Herzinsuffizienz, Hypertonie, oSAS)
3. Evtl. Primärindikation bariatrische Chirurgie bei BMI > 50 kg/m² ohne besondere Begleit- oder Folgeerkrankungen

Präoperative Diagnostik

Klinische Untersuchung

Körperlänge, Körpergewicht, Taillenumfang, Blutdruck, Puls und evtl. Körperzusammensetzung bestimmen

Nüchtern BZ, HbA_{1c}, evtl. oGTT und Mikroalbuminurie, Kreatinin, Elektrolyte

Gesamt-, HDL- und LDL-Cholesterin, Triglyzeride

Mikronährstoffe

TSH, evtl. andere endokrinologische Parameter (Cortisol)

EKG, evtl. Ergometrie, Herzecho, 24-h-RR, Schlafapnoe-Screening

evtl. Oberbauchsonographie, Doppler-Sonographie

Ösophagogastroduodenoskopie

Bariatrische/Metabolische Chirurgie Operative Verfahren

Magenband

(GB)

Schlauchmagen

(SG)

RYGB

(pRYGB)

Biliopancreatische
Diversion

(BPD-DS)

Adipositas-Chirurgie Banding vs. vertikale Gastroplastik vs. Bypass (SOS-Studie)

n= 2010/2037
Alter: 46 Jahre
BMI 41 kg/m²
w/m: 3:1

Gewichtsverlauf (%)

No. examined	0	1	2	3	4	6	8	10	15	20
Control	2037	1490	1242	1267	556	176				
Banding	376	333	284	284	150	50				
VBG	1369	1086	987	1007	489	82				
GBP	265	209	184	180	37	13				

Metabolische Chirurgie

konservative Therapie vs. Schlauchmagen vs. Magenbypass

(STAMPEDE-Studie), Ergebnisse nach 5 Jahren

Prim. Outcome:
HbA_{1c} 6% oder tiefer mit oder ohne Antidiabetika

Schauer PR et al, NEJM 2017; 376: 641-51

Metabolische Chirurgie

konservative Therapie vs. Schlauchmagen vs. Magenbypass

Gewichtsverlauf (kg/m^2) über 5 Jahre

Mittelwert (Median) Wert bei Studienbesuch	0	6	12	24	36	48	54	60
Intensive antidiabetische Therapie	36,4	34,1	35,0	34,8	35,1	34,0		
Magenbypass	37,0	26,9	27,4	28,2	28,6	28,9		
Schlauchmagen	36,0	26,9	27,7	28,1	28,2	29,3		

Schauer PR et al, NEJM 2017; 376: 641-51

Diabetesremission nach chirurgischer vs. konservativer Therapie

- Gepoolte Analyse aus randomisierten Studien, die den Effekt von metabolischer Chirurgie vs. Lebensstil-intervention bzw. medikamentöser Therapie bei Patienten mit Adipositas + Typ-2-Diabetes untersuchen
- 316 Patienten, davon 195 nach OP vs. 121 mit konservativer Therapie
- Primärer Endpunkt: Diabetesremission mit HbA1c < 6,5 % nach 3 Jahren über 3 Monate ohne medikamentöse antidiabetische Therapie

Kirwan JP et al., Diabetes Care 2022; 45: 1574-1583

Diabetesremission nach chirurgischer vs. kons. Therapie

HbA1c-Verlauf nach chirurgischer vs. unter konservativer Therapie

Diabetesremission:
37,5 % nach chirurgischer Therapie
2,6 % nach konservativer Therapie

Kirwan JP et al., Diabetes Care 2022; 45: 1574-1583

Metabolische Chirurgie bei Patienten mit Typ 2 Diabetes

Primärer Endpunkt: MACE 6

Retrospektive Kohortenstudie der Cleveland Clinic aus Unterlagen 1998–2017
N=2287, OP versus 22435 gematchte Kontrollen
Alter 52/54 Jahre, BMI 42/45, HbA1c 7,6, Insulin 33%

Nissen S et al, JAMA. 2019;322(13):1271–1282. doi:10.1001/jama.2019.14231

Krebsinzidenz nach bariatrischer Chirurgie bei Patienten mit Adipositas und Diabetes

- Analyse von Langzeitdaten aus der Swedish Obese Subjects (SOS) Study
- 701 Patienten mit Adipositas und Typ-2-Diabetes zu Studienbeginn, davon 393 nach OP vs. 121 mit konservativer Therapie
- Mediane Beobachtungszeit 21,3 Jahre
- Daten zur Krebsinzidenz aus nationalem schwedischem Krebsregister

Sjöholm K et al., Diabetes Care 2022; 45: 444–450

Krebsinzidenz nach bariatrischer Chirurgie bei Patienten mit Adipositas und Diabetes

Kumulative Inzidenz einer erstmaligen Krebserkrankung

Sjöholm K et al., *Diabetes Care* 2022; 45: 444-450

Fazit für die Praxis

- Metabolische Chirurgie ist der medikamentösen Therapie des Typ-2-Diabetes bei Adipositas auch langfristig deutlich überlegen.
- Bei vorhandenem Diabetes scheint der Nutzen einer bariatrischen Intervention größer als ohne Diabetes (Kirwan et al. 2022).
- Erhöhte Suizidrate, Substanzgebrauchsstörungen und andere psychische Komplikationen nach Adipositaschirurgie erfordern weitere Klärung und sorgfältige Patientenauswahl für die chirurgische Adipositastherapie.

Nachsorge

Bariatrische Chirurgie – Empfehlungen zur Nachsorge

Empfehlung 7.4

Jeder Patient soll innerhalb der ersten 3 – 6 Monate mindestens einmal von einem in der Adipositas- bzw. metabolischen Chirurgie erfahrenen Chirurgen an der operierenden Einrichtung gesehen werden.

LAGB	SG	pRYGB	BPD-DS
Nach 6 und 12 Mo, dann jährlich		Nach 3, 6 und 12 Mo, bei proximalen Bypässen dann jährlich, bei distalen Bypässen dann halbjährlich	

Bariatrische Chirurgie – Nachsorge Supplementationsempfehlungen

	SG	pRYGB	BPD-DS
Protein (gesamt pro Tag)	>60g/d	>60g/d	>90g/d
Eisensulfat, -fumarat, -gluconat	MVM-Präparat 2x/d	50 mg/d	2x100 mg/d
Vitamin B12	oral: 1000 µg/d oder i.m.: 1000-3000 µg/d alle 3 bis 6 Monate		
Folsäure	MVM-Präparat 2x/d	600 µg/d	
Vitamin B1	MVM-Präparat 2x/d, keine Dosis-Empfehlung		
Vitamin D	Mind. 3000 IU/d, Serumkonzentration >30ng/ml		
Calciumcitrat	1200-1500 mg/d		
Vitamin A	MVM-Präparat 2x/d	MVM-Präparat 2x/d	1-2x25000 IU/d
Vitamin E, K	MVM-Präparat 2x/d, keine Dosisempfehlung		
Zinkgluconat, -sulfat, -acetat	MVM-Präparat 2x/d	MVM-Präparat 2x/d	8-15 mg/d
Magnesiumcitrat	200 mg/d		
Kupfergluconat, -oxid, -sulfat Natriumselenit (Selen)	Keine Empfehlung	MVM-Präparat 2x/d mit 2 mg/d Kupfer

Bariatrische Chirurgie – Nachsorge Empfehlung Laborkontrollen

	LAGB	SG	pRYGB	BPD-DS
	Nach 6 und 12 Monaten, dann jährlich		Nach 3, 6 und 12 Monaten, Bei proxim. Bypässen: dann 1-jährlich Bei distalen Bypässen: dann ½-jährlich	
Protein	X	X	X	X
Ferritin	X	X	X	X
Vitamin B12	X	X	X	X
Folsäure	X	X	X	X
Vitamin B1	X	X	X	X
Vitamin D-25 (OH)			X	X
Calcium	X	X	X	X
Vitamin E			X	X
Vitamin K			X	X
Kupfer				X
Parathormon			X	X
Vitamin A			X	X
Selen				X
Zink			X	X
Knochendichte	Fakultativ, in Abhängigkeit vom Verfahren u. individuellem Risiko			

Adipositas – Take Home Message

- Adipositas ist als Krankheit einzuordnen (ICD 10: E66.-)
- Durch Gewichtsreduktion werden Adipositas-assoziierte Begleiterkrankungen positiv beeinflusst
- Verordnung von konservativen Maßnahmen DiGA über Rezept
- Neue Möglichkeiten der medikamentösen Therapie
- Bariatrische Operation effektiv aber teuer und nur bei gezielter Indikationsstellung und mit sorgfältiger Nachsorge

Endokrinologie

Schilddrüse: Über-/Unterfunktion, Schwangerschaft, Knoten

Jörg Bojunga, Frankfurt a. M.

Schilddrüse: subklinische Funktionsstörungen

Falldarstellung

- Managerin, 49 J, ungewollte Gewichtszunahme, abgeschlagen, abnehmendes sexuelles Verlangen
- TSH 3,7 U/ml, TPO 60 U/l (<35)
- Schilddrüsenpraxis: Hashimoto, Unterfunktion, Thyroxin notwendig, Schilddrüse muss entlastet werden

Falldarstellung

- Rentnerin, 70J, seit 40 Jahren „Hashimoto“
- TSH 0,35 U/ml unter LT4 125µg, TPO 300 U/l
- Sono: atrophe, schwächer echogene Schilddrüse, Vol. 2ml
- Vorbefunde (ca. 50 Stück): SD gut entlastet, weiter so

Hypothyreose - Symptome

Subklinische Hypothyreose

- **Symptome:** **kein Zusammenhang** zwischen SHypo und BMI, Depression, Fatigue, Aktivität, Wohlbefinden, Gehstrecke, Handkraft, Kognition, kardiovaskulären Erkrankungen, sexueller Aktivität **nachweisbar**, solange TSH nicht > 7mU/l
- **Therapie:** **kein Effekte von LT4** bei SHypo auf BMI, Depression, Fatigue, Aktivität, Wohlbefinden, Gehstrecke, Handkraft, Kognition, kardiovaskuläre Erkrankungen **nachweisbar**, solange TSH nicht > 7mU/l

Subklinische Hyperthyreose

- **Symptome:** **eindeutiger Zusammenhang** zwischen SHpyer und Vorhofflimmern, Schlafstörungen, depressiven Episoden (!), erhöhter kardiovaskulärer und Gesamtmortalität bei älteren Menschen, teilweise auch schon bei TSH im unteren Referenzbereich
- **Ursachen:** in 50% iatrogen (LT4-Therapie!), Initiierung oft bei TSH zwischen 4,5mU/l und 7mU/l), bei jüngeren Menschen häufiger M. Basedow, bei älteren Menschen häufiger Autonomien

Subklinische Hypothyreose - Verlauf

Lancet 2012; 379: 1142-54

Subklinische Hyperthyreose - Mortalität

Lancet 2012; 379: 1142-54

Subklinische Hypothyreose - Therapie

	Alter < 65 Jahre	Alter ≥ 65 Jahre
TSH 4,5–6,9 mIU/l	<ul style="list-style-type: none"> - Bestimmung Anti-TPO-AK - Bei asymptomatischen Patient*innen jährliche TSH-Bestimmung LT₄-Substitutionstherapie erwägen bei: <ul style="list-style-type: none"> - Hypothyreosesymptomen - Erhöhten Anti-TPO-AK - Im Verlauf ansteigenden TSH-Werten - Kinderwunsch - Struma nodosa 	Keine Behandlungsempfehlung
TSH 7–9,9 mIU/l	LT ₄ -Therapieempfehlung, um das Risiko für einen tödlichen Apoplex und die kardiovaskuläre Mortalität zu reduzieren	LT ₄ -Substitutionstherapie erwägen, insbesondere bei hohem kardiovaskulären Risiko
TSH ≥ 10 mIU/l	LT ₄ -Therapieempfehlung, so dass das Risiko für einen Progress in eine manifeste Hypothyreose sowie das Auftreten einer Herzinsuffizienz, von KHK-Ereignissen und die kardiovaskuläre Mortalität reduziert werden.	

Koehler, Bojunga, Dtsch Med Wochenschr 2021; 146: 1–8

Subklinische Hyperthyreose - Therapie

**Häufigste Ursache:
- iatrogen durch L-Thyroxin!**

Falldarstellung

- Managerin, 49 J, ungewollte Gewichtszunahme, abgeschlagen, abnehmendes sexuelles Verlangen
- TSH 3,7 U/ml, TPO 60 U/l (<35)
- Schilddrüsenpraxis: Hashimoto, Unterfunktion, Thyroxin notwendig, Schilddrüse muss entlastet werden
- **Sono:** Normalbefund; Kein TRH-Test, keine Szinti !
- **Therapie:** Empfehlung sportliche Betätigung, kein Thyroxin
- **Kontrolle 3 Monate:** Wohlbefinden, TSH 2,1 U/l
- **Empfehlung:** TSH-Kontrolle nach 6 Monaten, dann 1x/Jahr oder bei Beschwerden. Normale alimentäre Jodzufuhr. HT?

Falldarstellung

- Rentnerin, 70J, seit 40 Jahren „Hashimoto“
- TSH 0,35 U/ml unter LT4 125µg, TPO 300 U/l
- Sono: atrophe, schwächer echogene Schilddrüse, Vol. 2ml
- Vorbefunde (ca. 50 Stück): SD gut entlastet, weiter so
- **Therapie:** Thyroxin mutmaßlich notwendig, aber gefährliche Übertherapie, TSH langsam an das Alter adaptieren
- Ziel TSH um 4-6 U/l (?), langsame Dosisreduktion, subtile Anamnese
- **Kontrolle** TSH 8-12 Wochen nach Dosisänderung

Schilddrüse und Schwangerschaft

- Soll man screenen oder case finding?
- Was tun bei pos. TPO-Antikörpern vor einer Schwangerschaft?
- Was tun bei bestehender LT4-Therapie?
- Was tun bei subklinischer Hypothyreose bei pos. Schwangerschaftstest?
- Was tun bei manifester Hyperthyreose in der Schwangerschaft?

Schilddrüsenfunktion in der Schwangerschaft

Bojunga et al., J. Gynäkol. Endokrinol. 2021, 24:82-92

Interpretation von TSH, fT3, fT4 während der Schwangerschaft

Trimester	TSH [mIU/l]*	FT4 [pg/ml]**	FT3 [pg/ml]**
1	0,1–2,5	9,4–15,3	2,46–3,89
2	0,2–3,0	7,5–13,2	2,09–3,55
3	0,3–3,0	6,5–12,1	2,01–3,27

* ATA Empfehlungen 2011, **Angaben für die von den Autoren verwendete Methode

Barthel et al. Dtsch Med Wochenschr 2012; 1370

Schilddrüsenfunktion in der Schwangerschaft

Bojunga et al., J. Gynäkol. Endocrinol. 2021, 24:82–92

Behandlungsalgorithmus Schwangerschaft und Schilddrüse

Frank-Raue K., Klinikarzt 2019; 48: 541-545

LT4- in der Schwangerschaft – Übertherapie vermeiden

Nat Rev Endocrinol. 2017 Oct;13(10):610-622.

Fazit für Klinik und Praxis I

- Die bisherigen Empfehlungen haben Bestand: LT4 ab einem TSH $>4\text{mU/l}$
- Jodid in der SS: Zufuhr durch Substitution sinnvoll (auch bei AIT und behandeltem Basedow!), natürliche Quellen sind kein Ersatz
- Präkonzeptionelle LT4-Gabe bei SH: offenbar kein Vorteil vs. Frühschwangerschaft
- Bei bereits bestehender LT4-Therapie: TSH $<2,5\text{mU/l}$ präkonzeptionell (ggf. $<1,2\text{mU/l}$)

Fazit für Klinik und Praxis II

- Frühgeburtlichkeit: Risikofaktoren subklinische Hypothyreose (SH), Hypothyroxinämie, pos. TPO-AK
- LT4 vor Schwangerschaft bei pos. TPO-AK: kein Effekt auf Lebendgeburtsrate (ggf. nach 2 Aborten sinnvoll?)
- Überbehandlung einer SH in der SS: Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern

Fazit für Klinik und Praxis – Basedow in der Schwangerschaft

- Bei TRAK > 3,7x ULN: Monitoring des Fetus
- Thyreostatika in der SS: möglichst vermeiden, ggf. absetzen
- PTU weniger Geburtsfehler als MMI
- Umsetzen auf PTU wenn möglich vor der Schwangerschaft (Zeitpunkt unklar), nach dem 1. Trimenon Umsetzen von PTU auf MMI; Stillen: MMI

KLUG ENTSCHIEDEN

... in der Endokrinologie

3. Allen Schwangeren soll eine Jodsupplementation angeboten werden.

**Positiv-
Empfehlungen**

Schilddrüse: Knoten

Schilddrüsenknoten in Deutschland

- Schilddrüsenknoten sind sehr häufig – bis 70% der Menschen
- Die Malignitätsrate ist sehr gering: 1%
- Sonografisches Screening verringert die Mortalität nicht, erhöht jedoch OP-Komplikationen
- Kein anderes Land der Welt führt eine derart hohe Anzahl an SD-OP durch wie Deutschland
- **Klinische Herausforderung:** aus den sehr vielen gutartigen die seltenen bösartigen Knoten einer weiteren Diagnostik und Therapie zuzuführen

Indikationen zur Feinnadelpunktion

Sonographic Pattern	Estimated malignancy risk	Consider biopsy	Strength of rec	Quality of evidence
High suspicion	>70-90%	≥ 1 cm	Strong	Moderate
Intermediate suspicion	10-20%	≥ 1 cm	Strong	Low
Low suspicion	5-10%	≥ 1.5 cm	Weak	Low
Very low suspicion	< 3%	≥ 2 cm	Weak	Moderate
Benign	< 1%	No biopsy	Strong	Low
FNA is not recommended for nodules that do not meet the above criteria, including all nodules < 1 cm			Strong	Moderate

Haugen, Thyroid 2015 Oct 14.

Risikostratifizierung von Schilddrüsenknoten nach ATA*

ATA-Risikokategorie	Relative Risiko	Sonographische Kriterien	Biopsieindikator	Indikation zur FNAC (größer Durchmesser)
1. Hochsuspekt	10-90%	Schädel stark schilddrüsen-echogener Knoten oder schilddrüsen-echogener partiell echogener Knoten mit einem oder mehreren der folgenden Merkmale: unregelmäßige Longitudinalkontur mit unklarem, unkontinuierlichem oder spiculiertem, Mikrokalzinierungen, höher als breit (HAR), Halo (Halozeichen), unterfokale Longitudinalstrahlungen mit konzentrischen schilddrüsen-echogenen Ringstrahlungen, unregelmäßige Kapselstruktur, unregelmäßige Diffusion, unregelmäßige Peripherie		Empfohlen > 1 cm
4. Intermediate suspekt	10-20%	Schilddrüsen-echogener solitärer Knoten mit geringer Ausdehnung, ohne Mikrokalzinierungen, unterfokale Longitudinalstrahlungen oder unregelmäßige Diffusion		Empfohlen > 1 cm
3. Gering suspekt	3-10%	Unschilddrüsen-echogener solitärer Knoten oder partiell echogener Knoten mit unregelmäßiger Longitudinalkontur, unregelmäßiger Kapselstruktur, unterfokale Longitudinalstrahlungen, unterfokale Longitudinalstrahlungen, unterfokale Longitudinalstrahlungen		Empfohlen > 1,5 cm
2. Sehr gering suspekt	< 3%	Spangelförmiger oder teilweiser echogener Knoten ohne unregelmäßige Longitudinalkontur, unregelmäßige Kapselstruktur, unterfokale Longitudinalstrahlungen oder unregelmäßige Diffusion		Empfohlen > 2 cm Biospektion ohne FNAC, ebenfalls mögliche Option
1. Benign	< 1%	Ausdruckslos/typischer Erscheinung, gleichmäßig echogener Knoten mit unregelmäßiger Longitudinalkontur, unregelmäßiger Kapselstruktur, unregelmäßige Diffusion, unregelmäßige Peripherie		Keine FNAC

Knoten nach ATA nicht klassifizierbar?
Im 10-er-Quadrat (1-4) kann nicht sicher nach ATA klassifiziert werden. Diese Knoten werden ebenfalls als unklassifizierbar eingestuft (auf der ATA 2015, die keine eine Klassifizierung von sonographischen Einzelknoten und Solitarnodulen, z.B. ATA 1/2/3/4, vorgenommen werden).

Wann ist eine Schilddrüse abnormal?
Schilddrüse ist abnorm, wenn sie größer ist als eine erwachsene Schilddrüse (20 Liter oder mehr) oder wenn sie eine vergrößerte Schilddrüse (ATA 2015) hat. Eine Schilddrüse ist auch abnorm, wenn sie eine vergrößerte Schilddrüse (ATA 2015) hat.

Visualisierung und Perfektion
Die Schilddrüse ist ein Organ, das im Ultraschall (US) gut sichtbar ist. Die Schilddrüse ist ein Organ, das im Ultraschall (US) gut sichtbar ist.

Elastographie von Schilddrüsenknoten
Elastographie ist eine Technik zur Messung der Steifigkeit von Gewebe. Sie wird verwendet, um die Steifigkeit von Schilddrüsenknoten zu messen.

Lymphknotenmorphologie
Die Morphologie von Lymphknoten ist ein wichtiger Indikator für die Diagnose von Schilddrüsenknoten.

Spezielle Lokalisationen
Spezielle Lokalisationen von Schilddrüsenknoten sind ein wichtiger Indikator für die Diagnose von Schilddrüsenknoten.

Autonomes Adenom: Szintigrafie notwendig

Elastografie: ein neues Diagnosetool

vor Kompression unter Kompression

Weiche Knoten – praktisch immer gutartig

Elastografie – auch bei kleinen Knoten

Calcitoninscreening – weiterhin empfohlen

► **Tab. 2** Korrelation des basalen Calcitonin-Wertes präoperativ mit der Tumorgröße des MTC, mit Lymphknotenfiliae und der biochemischen Heilungsrate bei 300 Patienten mit MTC (n = 175 sporadisch, n = 125 hereditär) [9].

basales Calcitonin (pg/ml)	MTC-Durchmesser (mm/Mittelwert)	Lymphknotenfiliae (n/Mittelwert)	biochemische Heilung (%)
10 – 20	3,3	0	100
20 – 50	4,5	0,5	100
50 – 100	6,2	0,3	100
100 – 200	8,9	1,5	81
200 – 500	11,4	2,3	81
500 – 1000	20,4	7,5	50
2000 – 10 000	27,5	9,3	18
> 10 000	34,9	35,5	0

Frank-Raue K et al. Empfehlung zum Calcitonin-Screening... Dtsch Med Wochenschr 2018; 143: 1065–1069

Calcitoninmessung – Graubereiche, Fehler

► **Tab. 4** Calcitonin-Screening bei der Struma nodosa: Vorschlag für klinische Graubereiche und Grenzwerte von Calcitonin-Basalwerten.

	Referenzbereich [7] (pg/ml)	klinischer Graubereich Calcitonin (pg/ml)	OP-Empfehlung Calcitonin (pg/ml)
Frauen	0,5 – 6,4	20 – 30	> 30
Männer	0,5 – 9,5	30 – 60	> 60

Frank-Raue K et al. Empfehlung zum Calcitonin-Screening... Dtsch Med Wochenschr 2018; 143: 1065–1069

Onlinekalkulatoren verbessern die Diagnostik

The screenshot shows the AACE thyroid calculator interface. At the top, there are tabs for 'Clinical', 'US without illustration', 'US with illustration', and 'Cytology'. A dropdown menu is open, listing various clinical factors:

- Family history of thyroid cancer - familial DTC or MTC or other syndromes
- PET positive or Sestamibi positive nodule
- Elevated calcitonin
- Clinical or imaging finding of regional adenopathy suspicious of malignancy
- Known diagnosis of thyroid cancer
- Either hard consistency or fixed nodule
- Head and neck radiation in the past
- Compressive symptoms - Dysphonia or dysphagia or dyspnoea without other cause
- Nodule position either posterior, adjacent to capsule or trachea

<https://aace-thyroid.deontics.com>

Onlinekalkulatoren verbessern die Diagnostik

The screenshot shows the AACE thyroid calculator interface with various input fields filled out:

- Largest dimension of the nodule in millimeters, on ultrasound scan:** 15
- Composition (Choose 1):** Spongiform - uniformly macroscopic throughout nodule
- Echogenicity (Choose 1):** Select...
- Shape of the nodule (Choose 1):** Select...
- Margins (Choose 1):** Select...
- Peripheral rim calcifications at margins (Choose 1):** Select...
- Echogenic foci (Choose all that apply):** Select...
- Vascularity (Choose 1):** Select...
- Does solid component within mixed nodule have any of the following features? (Answer only if Mixed composition):** Select...

On the right side, there are sections for 'AACE BIOPSY ADVICE' (Monitor at 12-24 months) and 'ASSESSMENT COMPLETION' (Agree and complete assessment).

<https://aace-thyroid.deontics.com>

Tab. 2 Negativer prädiktiver Wert der ¹²³I-MIBI-Szintigrafie beim hypofunktionellen Schilddrüsenknoten.

Erstautor, Jahr der Publikation	Pat.-zahl	FPC oder FIC [Zahl]		Benigne Histologie [Zahl]		Negativer präd. Wert [%]
		MIBI pos.	MIBI neg.	MIBI pos.	MIBI neg.	
Fildes 1993	34 ¹	3 ¹	0	20 ¹	10 ¹	100
Sundram 1995	58	12	2	26	18	90
Nakahara 1996	25	13	0	8	4	100
Krasnik 1997	62	5	6	18	32	84
Alonso 1998	32	1	0	12	14	100
Mozzi 1999	56 ²	12 ²	0	39 ²	5 ¹	100
Erdi 2000	40	21	0	14	5	100
Sarikaya 2001	25	6	0	13	6	100
Sathage 2001	69 ³	20	1	11	37	97
Demirel 2003	43	8	0	31	3	100
Hurtado-L 2004	130	49	0	32	48	100
Thissen 2009	63	7	1	25	30	97
Ciavarella 2010	74	3	0	8	63	100
Hernández 2010	69	25	3	29	12	80
Leitig B. 2012	127	15	2	71	39	95
Okenda 2012	1371	54	9	248	60	87
Eliet 2014	104	10	5	n.a.	n.a.	97
Schenker 2014	83	11 (12)	1 (0)	60 (55)	11 (16)	92
Wale 2014	100	17	0	64	27	100
Credikumar 2015	137	22	14	22	79	85
Sager 2015	24	6	1	4	13	93
Compagni 2016	105	17	18	9	61	77
Pizzardi 2016	87					82
SUMME	1926					>94%

Pat.-zahl = Zahl der Patienten mit entweder papillärem (FPC) oder follikulärem (FIC) Schilddrüsenkarzinom oder benigner Histologie nach der Operation. Ausnahme MIBI pos. = positiv für MIBI uptake, MIBI neg. = negativ für MIBI uptake, n.a. = data not available
Eliet 2014: 104 Patienten mit 167 KZ, 20 KZ mit unvollständiger und 1 KZ mit nicht-erwarteter MIBI uptake, 90 Patienten mit benignem Befund.
Schenker 2014: plusus Werte und (P/F) Werte in Klammern
Credikumar 2015: Die mediane Knotengröße betrug 6,3 mm (6,3–22 mm) und 23 (16,7%) der Patienten hatten Mikrokarcinome.
Sager 2015: 23 Patienten mit 24 Schilddrüsenkarzinomen
Compagni 2016: 105 Patienten mit der pathologischen Diagnose einer follikulären Neoplasie. Patient 2 wird als MIBI-positiv und Patient 1 als MIBI-positiv bewertet.
¹ bedeutet nicht Zahl der Patienten, sondern Zahl der Schilddrüsenkarzinome
² Sathage 2001: 71 Patienten = 1 metastatisches Schilddrüsenkarzinom = 1 atypisches Karzinom = 69 Patienten

Schmidt Matthias et al. Update 2019 zur ... Der Nuklearmediziner 2019; 42: 174–182

Zusammenfassung Schilddrüsenknoten

- Die Charakterisierung von Schilddrüsenknoten (Sonographie & FNP) muss in Deutschland verbessert werden, die Häufigkeit von diagnostischen Operationen ist weiterhin zu hoch
- Eine Befundstandardisierung verbessert die Knotencharakterisierung und reduziert unnötige weitere Diagnostik und Therapie – neue Scores (TIRADS) sind hierzu evaluierte Optionen
- ATA ist einfach und gut evaluiert, nicht klassifizierbare Knoten haben ein signifikantes Malignitätsrisiko

Zusammenfassung Schilddrüsenknoten

- ACR-TIRADS schneidet am besten ab und reduziert unnötige FNP am meisten
- Die Elastographie ist ein supplementäres Verfahren für ausgewählte Knoten: ein elastographisch weicher Knoten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gutartig
- Jodid/L-Thyroxin: bei Menschen >50 Jahre meist nicht sinnvoll, negative Effekte möglich

Schilddrüsenknoten – Therapie

- Der Routineeinsatz von L-Thyroxin bei Patienten mit Schilddrüsenknoten wird nicht empfohlen
- LT4-Therapie oder Jodid-Supplementierung kann erwogen werden: bei jungen Patienten mit kleinen Knoten in Jodmangelgebieten und Patienten mit Struma multinodosa nach Ausschluß einer Autonomie
- LT4-Therapie sollte vermieden werden bei Patienten mit großen Knoten, lang bestehender Struma; bei Patienten mit niedrig-normalen TSH-Werten; bei postmenopausalen Frauen; Männern über 60; bei Patienten mit Osteoporose, kardiovaskulären Erkrankungen oder relevanten Allgemeinerkrankungen
- DK: Kontraindikationen bei 84% der Patienten (DS: 63%;UNS:77%, MNS:91%)

KLUG ENTSCHIEDEN

... in der Endokrinologie

3. Ein Ultraschallscreening auf Schilddrüsenveränderungen bei älteren Menschen soll nicht durchgeführt werden.

**Negativ-
Empfehlungen**

4. Eine Dauertherapie mit Levothyroxin bei Struma nodosa soll nicht durchgeführt werden.

Deutsches Ärzteblatt | Jg. 113 | Heft 17 | 29. April 2016

Schilddrüse: M. Basedow

M. Basedow – klinisches Bild

N ENGL J MED 375;16 NEJM.ORG OCTOBER 20, 2016

Wie entsteht ein M. Basedow?

Diagnose des M. Basedow

Eur Thyroid J 2018;7:167-186
DOI: 10.1159/000490384

Therapie des M. Basedow

Eur Thyroid J 2018;7:167-186
DOI: 10.1159/000490384

Thyreostatika

Cooper. NEJM 2005; 352: 905

06. Februar 2019

Carbimazol- oder Thiamazol (Synonym: Methimazol)- haltige Arzneimittel – (1) Risiko einer akuten Pankreatitis und (2) Verstärkung der Empfehlung zur Kontrazeption

M. Basedow – Äquivalenzdosen ATD

Äquivalenzdosen und Dosierung

	Propylthiouracil	Thiamazol	Carbimazol
Äquivalenzdosis	15 mg	1 mg	1,6 mg
Dosierung initial	150-300 mg	10-20 (40) mg	20-40 mg
Dosierung später	50-150 mg	2,5-10 mg	5-10 mg

TRAK-Verläufe unter Therapie

M. Basedow – wie lange therapieren?

Period	Findings
1941–1960	- Treatment duration of < 12 months - Variable modes of treatment and relapse rates of 0–85%
1961–1980	- Larger number of patients and longer follow-ups - Duration of ATD therapy mostly 6–24 months - Reports of few patients with 5–12 years of ATD treatment
1981–2000	- ATD treatment was the second choice for Graves' hyperthyroidism in the USA - Duration of 12–24 months was chosen for most studies - Few studies of > 24 months ATD therapy claimed lasting remission
2001–2021	- The duration of ATD therapy was arbitrarily chosen as 12–18 months - Methimazole was chosen as the first choice for Graves' disease therapy - Various trends of TRAb levels during and after ATD were identified - Safety and efficacy of long-term ATD treatment were established - Cure rate up to 85% was reported after long-term ATD therapy

ATD antithyroid drug; TRAb thyrotropin receptor antibody

M. Basedow – Zusammenfassung

- Ursachen des Basedow sind eine genetische Prädisposition und auslösende Faktoren (auch COVID19, ICI)
- Die Diagnose beruht auf Klinik, Labor, Ultraschall, selten Szintigraphie
- Ein TRAK-neg. Basedow ist selten, der TRAK ist jedoch auch bei anderen SD-Erkrankungen pos.
- Therapiedauer mit Thyreostatika bisher meist 18 Monate, jedoch auch deutlich länger möglich; in leichten Fällen Spontanremission insb. bei Jüngeren und Schwangeren möglich

M. Basedow – Zusammenfassung

- Heute Titration bevorzugt vor “block and replace“
- Prognosefaktor Therapieansprechen, Struma, TRAK, Rauchen
- Typ. UAW: Agranulozytose, Lebertoxizität, Exanthem, auch andere wie Arthralgien und Pankreatitis; definitive Therapie: RJT (TRAK ↑↑), OP
- QoL bei einem Teil der Patienten auch nach erfolgreichen Therapie eingeschränkt

Endokrinologie

Hypophyse, Nebennieren, Endokrin bedingte Hypertonie, Nebenschilddrüsen, Osteoporose

Jörg Bojunga, Frankfurt a. M.

Hypophyse: nicht-funktionelle Tumore

Kasuistik Hypophysenadenom

- 43-jährige Patientin
- Seit mehreren Monaten Kopfschmerzen
- Im MRT 1,5 cm große Sella-Raumforderung
- Klinisch kein Hinweis auf eine Hormonstörung
- Sonst keine Symptome oder Vorerkrankungen

→ Häufiges Problem: Prävalenz ca. 10 %

→ Was muss nun alles (nicht) gemacht werden?

Deutsche Leitlinie Hypophysenadenome

Empfehlung 3.1:

Jeder Patient mit neu nachgewiesenem oder bekanntem Hypophysentumor **soll** von einem interdisziplinären Team aus in der Behandlung von Hypophysentumoren erfahrenen Ärzten* diagnostiziert und behandelt werden.

Starker Konsens

* Obligat unter Einbezug von Endokrinologie, Neurochirurgie und (Neuro-)Radiologie, je nach Tumorgöße oder geplanter Intervention zusätzlich auch noch (Neuro-)Pathologie, Ophthalmologie und Strahlentherapie, bei speziellen Fragestellungen ggf. auch andere Fachdisziplinen (z.B. Gynäkologie, Neurologie und Psychologie).

Hypophysenadenom – welche Diagnostik?

Empfehlung 4.1:

Bei Patienten mit einem Hypophysentumor **sollen** eine ausführliche Anamnese und klinische Untersuchung zur Evaluation von Symptomen einer Hypophyseninsuffizienz bzw. eines Hormonexzesses sowie von lokalen Symptomen durch die Raumforderung durchgeführt werden.

Starker Konsens

Hypophysenadenom – welche Diagnostik?

Obligate Laborparameter bei Erstdiagnose eines Hypophysentumors
• Prolaktin
• TSH, fT3, fT4
• IGF-1
• LH, FSH, geschlechtsspezifisches Sexualhormon - bei prämenopausalen Frauen Östradiol, bei Männer Gesamt-Testosteron
• 1 mg Dexamethason-Hemmtest
• Morgendliches basales Cortisol - nur bei Adenomen ≥ 6 mm, bei grenzwertigen Befunden Funktionstests

Hormominaktives Hypophysenadenom – wann beobachten?

Empfehlung 5.1:

Bei symptomlosen, hormoninaktiven Hypophysentumoren (< 1 cm) **soll** der Patient primär observierend begleitet werden („wait and scan“).

Bei symptomlosen, hormoninaktiven Hypophysentumoren (≥ 1 cm) **kann** der Patient meist primär observierend begleitet werden („wait and scan“).

Starker Konsens

Nachsorge bei Hypophysen- adenomen ohne OP-Indikation

	Erste Kontrolle nach Erstdiagnose		Weitere Kontrollen	
	Zeitpunkt	Inhalt	Zeitpunkt	Inhalt
Mikroadenom	nach 12 Monaten	- Hormonlabor - Sella-MRT	- zunächst nach 24 und 36 Monaten - weitere Kontrollen nach individueller Einschätzung (Intervalllänge diskutieren!)	- Hormonlabor - Sella-MRT
Makroadenom <i>ohne</i> Kontakt zu Strukturen der vorderen Sehbahn	nach 6 Monaten	- Hormonlabor - Sella-MRT	- jährliche Kontrollen über 3 Jahre (d.h. inkl. Erstkontrolle insg. 4 Kontrollen) - weitere Kontrollen nach individueller Einschätzung (Intervalllänge diskutieren!)	- Hormonlabor - Sella-MRT
Makroadenom <i>mit</i> Kontakt zu Strukturen der vorderen Sehbahn	nach 3-6 Monaten	- Hormonlabor - Sella-MRT - Augenarzt	- jährliche Kontrollen über 3 Jahre (d.h. inkl. Erstkontrolle insg. 4 Kontrollen) - weitere Kontrollen nach individueller Einschätzung (Intervalllänge diskutieren!)	- Hormonlabor - Sella-MRT - Augenarzt

Hypophyse: Akromegalie

Akromegalie - Klinik

Aus: DGE Patientenbroschüre Akromegalie

Physical changes

- Prominence of the brow
- Prognathism
- Macroglossia
- Hyperhidrosis
- Enlargement of the nose and lips
- Soft-tissue hypertrophy
- Acral overgrowth

Metabolic and endocrine complications

- Impaired glucose tolerance
- Diabetes mellitus
- Insulin resistance
- Dyslipidaemia
- Thyroid goitre

Gastrointestinal complications

- Colonic polyps
- Dolichomegacolon

Reproductive disorders

- Menstrual disturbance
- Erectile dysfunction

Local tumour effects

- Headache
- Visual impairment
- Hyperprolactinaemia
- Hypopituitarism

Cardiovascular complications

- Hypertension
- Biventricular hypertrophy
- Cardiomyopathy
- Congestive heart failure
- Arrhythmias
- Valve disease

Respiratory complications

- Upper airway obstruction
- Ventilatory dysfunction
- Sleep apnoea
- Excessive snoring

Skeletal system complications

- Increased articular cartilage thickness
- Arthropathy
- Carpal tunnel syndrome
- Paraesthesia
- Vertebral fractures

1952 (23 Jahre alt)

1956 (27 Jahre)

1963 (35 Jahre)

1967 (39 Jahre)

1969 (41 Jahre)

1972 (54 Jahre)

1991 (63 Jahre)

2000 (72 Jahre)

1952 (23 Jahre alt)

1967 (39 Jahre)

1969 (41 Jahre)

1972 (54 Jahre)

1991 (63 Jahre)

2000 (72 Jahre)

(2008 75 Jahre)

Akromegalie – Symptome

J Clin Endocrinol Metab 88(10):4759–4767(2003)

Initiative Akromegalie

INITIATIVE AKROMEGALIE
Früher. Präziser. Optimaler.

„Ei, Großmutter, warum hast du so große Hände?“

„Weil meine Akromegalie zu spät erkannt worden ist.“

Akromegalie – Frühdagnose erhöht die Heilungschancen
Initiative Akromegalie: Machen Sie mit und fragen Sie Ihren Arzt!

Eine Initiative von
DEG
DEG

Akromegalie - Diagnostik

Nebenniere: Inzidentalome

Kasuistik

- 47-jährige Patientin
- Erstdiagnose einer Raumforderung der Nebenniere rechts 2013 im Rahmen einer Abdomensonografie
- Asymptomatisch

Cushing – Klinik

Cushing - Symptome

Symptoms	Signs	Overlapping conditions
<i>Features that best discriminate Cushing's syndrome; most do not have a high sensitivity</i>		
	Easy bruising	
	Facial plethora	
	Proximal myopathy (or proximal muscle weakness)	
	Striae (especially if reddish purple and >1 cm wide)	
	In children, weight gain with decreasing growth velocity	
<i>Cushing's syndrome features in the general population that are common and/or less discriminatory</i>		
Depression	Dorsocervical fat pad ("buffalo hump")	Hypertension ^a
Fatigue	Facial fullness	Incidental adrenal mass
Weight gain	Obesity	Vertebral osteoporosis ^a
Back pain	Supraclavicular fullness	Polycystic ovary syndrome
Changes in appetite	Thin skin ^a	Type 2 diabetes ^a
Decreased concentration	Peripheral edema	Hypokalemia
Decreased libido	Acne	Kidney stones
Impaired memory (especially short term)	Hirsutism or female balding	Unusual infections
Insomnia	Poor skin healing	
Irritability		
Menstrual abnormalities		
In children, slow growth	In children, abnormal genital virilization	
	In children, short stature	
	In children, pseudoprecocious puberty or delayed puberty	

^a Features are listed in random order.
^b Cushing's syndrome is more likely if onset of the feature is at a younger age.

	1-mg Dexamethason-Test					
Ergebnis 1mg Dexa-Test	≤ 50 nmol/l ≤ 1,8 mg/dl		51–138 nmol/l 1,9–5,0 µg/dl ¹		> 138 nmol/l > 5,0 µg/dl ¹	
Interpretation	Normal		Mögliche Autonome Cortisol-Sekretion		Autonome Cortisol-Sekretion	
Potentiell Cortisol-assoziierte Komorbiditäten?	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Operation erwägen? ³	Nein	Nein	Nein	Selten ²	Selten ²	Etwas häufiger ²
Re-Evaluation des Cortisol-Exzess und der Komorbiditäten (bei Patienten ohne Op) ⁴	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja

¹ Bei Patienten mit Komorbiditäten wird zur besseren Beurteilung des Ausmaßes des Cortisol-Exzesses weitere Diagnostik empfohlen: Plasma-ACTH, 24-h Urin auf freies Cortisol, Bedtime-Speichelcortisol

² Operationsentscheidung maßgeblich vom Alter und Wunsch des Patienten abhängig

³ Erwägung muss immer individuell erfolgen

⁴ Nachsorge durch Endokrinologen für 2–4 Jahre

Wann nach einem primären Hyperaldosteronismus suchen?

Table 2. Recommendations for primary aldosteronism (PA) screening in clinical setting

Hypertension and spontaneous or diuretic-induced hypokalemia
Hypertension and adrenal incidentaloma
BP above 150/100 on three separate measurements obtained on different days
Hypertension (BP $\geq$ 140/90) resistant to three conventional antihypertensive drugs (preferably including a diuretic)
Controlled BP (< 140/90) on four or more antihypertensive drugs
Hypertension and sleep apnea
Hypertension and a family history of early onset hypertension or cerebrovascular accident at a young age (< 40 years)
All hypertensive first-degree relatives of patients with PA

BP: blood pressure.

Arch Endocrinol Metab. 2017;61/3

Phäochromozytom – Symptome

Labordiagnostik:

- **Plasmametaneprine (2x)**
- **Ggf. Clonidin-Hemmtest**

- arterielle Hypertonie (> 95%)
- Cephalgien (80 - 95%)
- Schwitzen (65 - 70%)
- Tachykardien (60 - 70%)
- Blässe
- Zittern/Unruhe
- thorakale Schmerzen
- abdominelle Schmerzen
- Schwäche/Müdigkeit
- Gewichtsverlust

... in der Endokrinologie

**Negativ-
Empfehlungen**

2. Bildgebende Verfahren sollen erst nach Sicherung einer hormonellen Erkrankung eingesetzt werden.

Nebennieren – CT

Nebennieren - MRT

Cushing-Adenom

Br J Radiol 2016; **89**: 20151018.

Phäochromozytom

Nachsorge Nebennierenraumforderung

- Keine Nachsorge falls Größe <4cm, <10 HU und keine hormonelle Aktivität
- Patienten mit unklarer Raumforderung, die nicht operiert wurden, wird eine Folgebildgebung mittels nativem CT oder MRT nach 6 – 12 Monaten empfohlen
- Zeigt sich ein Wachstum > 20 % (bei mind. 5mm Durchmesserzunahme), führt dies dann (aber nur dann) zu einer Operationsempfehlung
- Eine endokrine Folgediagnostik beim Endokrinologen ist nur noch für die Patienten notwendig, bei denen eine (mögliche) autonome Cortisolsekretion diagnostiziert wurde oder wenn sich potenziell Cortisol-abhängige Komorbiditäten verschlechtern.

Kasuistik

- 47-jährige Patientin
- ED Raumforderung der Nebenniere rechts 2013
- asymptomatisch
- Größenprogress 2018
- Therapie: OP; Histologie: Adenom

Nebenniere: M. Addison

<https://www.jfklibrary.org/>

Nebenniere

Nebenniere – Insuffizienz

M. Addison

- 80% aller primären NNR-Insuffizienzen sind durch eine Autoimmunadrenalitis verursacht.
- auch im Rahmen eines Polyendokrinen Autoimmunsyndroms
- 4-6 Erkrankungen/100.000 Einwohner

Addison – Klinik

- Schwäche und rasche Ermüdbarkeit, Antriebslosigkeit
- Pigmentierung der Haut/Schleimhäute/Handlinien/Narben
- Gewichtsverlust, Dehydratation
- Hypotonie, Orthostase
- Übelkeit, Erbrechen, abdominelle Schmerzen
- symptomarmer Verlauf, dann aber Addison-Krise bei OP, körperlicher Belastung, Infektionen, Verletzungen

Häufige auslösende Faktoren bei Nebennierenkrisen und prozentuale Häufigkeit*

- gastrointestinaler Infekt (22–33 %)
- sonstige fieberhafte Infekte (17–24 %)
- Operationen (7–16 %)
- intensive körperliche Aktivität (7–8 %)
- psychischer Stress (4–6 %)

Addison – Labordiagnostik

- K⁺ erhöht, Na⁺ erniedrigt
- Kreatininanstieg
- Anämie, Eosinophilie, Hypoglykämie
- Cortisol im Serum (und im 24 h-Urin) erniedrigt
- ACTH erhöht
- Synacthen-Test: Cortisol steigt nach ACTH-Gabe nicht ausreichend an
- Nachweis von Nebennierenzell-Auto-AK

Addison – Therapie

- Notfallausweis
- Anpassung der Substitutionstherapie an Lebensumstände:
- fieberhafte Erkrankungen, Operationen: Steigerung auf 100 – 200 mg Hydrokortison
- Hydrocortison 10-15mg/m² KOF, z.B. 15-0-10 mg
- Mineralokortikoid: Fludrocortison 0,05 – 0,1 mg (Astonin H)

Therapiekontrolle:

- Normalisierung der Elektrolyte und Renin
- Normalisierung des Blutdrucks
- körperliches Wohlbefinden und Belastbarkeit (Muskelkraft)

KLUG ENTSCHEIDEN

... in der Endokrinologie

5. Eine Hydrocortisontherapie bei substitutionspflichtigen Patienten soll in relevanten Stresssituationen nicht ohne Dosisanpassung bleiben.

Negativ-Empfehlungen

Osteoporose

Osteoporose

- Die Inzidenz vertebraler Frakturen ist höher als die Inzidenz von Brustkrebs
- Die Lebenswahrscheinlichkeit einer Frau für eine Wirbelkörperfraktur beträgt 30%

Folgen multipler Frakturen

- Schmerzen
- Kyphose und Größenverlust
- Eingeschränkte Mobilität und funktionelle Einbußen
- 20% erleiden innerhalb eines Jahres eine Folgefraktur
- Erhöhte Morbidität und Mortalität

Osteoporose - Frakturrisiken

Baum et al., DÄB 2009

KLUG ENTSCHIEDEN

... in der Endokrinologie

1. Nach osteoporosetypischen Frakturen soll bei älteren Patienten in der Regel eine spezifische Osteoporosetherapie eingeleitet werden.

**Positiv-
Empfehlungen**

Osteoporose – wichtige Punkte

- Vorbeugen
- „Case finding“
- Basisdiagnostik
- Therapie - allgemein
- Therapie - speziell
- Zusammenfassung

Osteoporose – Klinik

Baum et al., DÄB 2009

TABELLE 1: GENERELLE EMPFEHLUNGEN FÜR EINE OSTEOPOROSE- UND FRAKTURPROPHYLAXE
(LANGFASSUNG KAPITEL 10)

Körperliche Aktivität, Stürze

Muskelkraft und Koordination risikoadaptiert, entsprechend dem funktionellen Status fördern, Immobilisation vermeiden, jährliche Sturzanamnese bei hohem Sturzrisiko: Ursachen- und Risikoabklärung, Therapie vermeidbarer Sturzursachen

Ernährung, Lebensstil

Body Mass Index (BMI) > 20 kg/m²

1000 mg Kalzium Gesamtzufuhr täglich, Kalzium-Supplemente nur, wenn Nahrungskalziumzufuhr zu gering

Bei einem hohen Sturz- und/oder Frakturrisiko und einer geringen Sonnenlichtexposition 800-1000 IE Vitamin D3 täglich oral (B)

Cave: Ausnahmen für die Empfehlungen zu Kalzium und Vitamin D3 gelten u. a. für den primären Hyperparathyreoidismus, Nierensteine, eine Hyperkalziurie und aktive granulomatöse Erkrankungen, kein Nikotinkonsum (A)

Medikamenten-Überprüfung

Regelmäßige Überprüfung des Verhältnisses von Nutzen und Risiken Fraktur-begünstigender Medikamente: Antidepressiva (B), Antiepileptika (B), Glitazone (A), orale und inhalative Glukokortikoide (A), Neuroleptika (B), Orthostase auslösende Medikamente (B, Protonenpumpeninhibitoren, vor allem bei Langzeiteinnahme (B), sedierende Medikamente (B, bei L-Thyroxin-Einnahme: TSH > 0,3 mU/L bis auf spezifische Ausnahmen beim differenzierten Schilddrüsenkarzinom (B)

DVO-Leitlinien 2017

TABELLE 2: EINE BASISDIAGNOSTIK WIRD EMPFOHLEN, WENN
das geschätzte 10-Jahres-Risiko für radiographische Wirbelkörperfrakturen und proximale Femurfrakturen 20% übersteigt oder bei unmittelbaren therapeutischen oder diagnostischen Konsequenzen, sofern Risiko aktuell bestehend oder vor weniger als 12-24 Monaten beendet.
(LANGFASSUNG KAPITEL 8)

Frauen nach der Menopause und Männer bei:

Niedrigtraumatische singuläre Wirbelkörperfraktur 2. Grades oder multiple Wirbelkörperfrakturen 1. Grades, sofern andere Ursachen nicht wahrscheinlicher sind

Klinisch manifeste niedrigtraumatische singuläre Wirbelkörperfraktur 1. Grades mit Deckplattenimpression, sofern andere Ursachen nicht wahrscheinlicher sind (ohne Klinik: Einzelfallentscheidung)
Niedrigtraumatische nichtvertebrale Frakturen (mit Ausnahme von Finger-, Zehen-, Schädel- und Knöchelfrakturen)

Frauen ab 60, Männer ab 70

Endokrinologische Erkrankungen (Kapitel 5.2.1)

Cushing-Syndrom und subklinischer Hyperkortisolismus (Kapitel 5.2.1.1)

Primärer Hyperparathyreoidismus (Kapitel 5.2.1.2)

Wachstumshormonmangel bei Hypophyseninsuffizienz (Kapitel 5.2.1.3)

Männlicher Hypogonadismus (Kapitel 5.2.1.4)

Subklinische und manifeste Hyperthyreose (Kapitel 5.2.1.5)

Diabetes mellitus Typ 1 (Kapitel 5.2.1.6)

Diabetes mellitus Typ 2 (Kapitel 5.2.1.7)

Rheumatologische Erkrankungen (Kapitel 5.2.2)

Rheumatoide Arthritis (Kapitel 5.2.2.1)

Spondylitis ankylosans (Kapitel 5.2.2.2)

Systemischer Lupus Erythematoses (Kapitel 5.2.2.3)

DVO-Leitlinien 2017

Gastroenterologische Erkrankungen (Kapitel 5.2.3)

Zöliakie (Kapitel 5.2.3.1)

B-II-Magenresektion oder Gastrektomie (Kapitel 5.2.3.2)

Neurologische/Psychiatrische Erkrankungen (Kapitel 5.2.4)

Epilepsie und Antiepileptika (Kapitel 5.2.4.1)

Schizophrenie (Kapitel 5.2.4.2)

Apoplektischer Insult (Kapitel 5.2.4.3)

Alzheimer Erkrankung (Kapitel 5.2.4.4)

Morbus Parkinson (Kapitel 5.2.4.5)

Depression (Kapitel 5.2.4.6)

Andere Erkrankungen (Kapitel 5.2.5)

Herzinsuffizienz (Kapitel 5.2.5.1)

Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (Kapitel 5.2.5.2)

Alkohol und alkoholische Lebererkrankung (Kapitel 5.2.5.3)

Anorexia nervosa (Kapitel 5.1.10)

Rauchen und chronisch obstruktive Atemwegserkrankung (COPD) (Kapitel 5.1.10)

Frakturrisiken durch eine medikamentöse Therapie (Kapitel 5.3)

Hormonablativ Therapie, männlicher Hypogonadismus anderer Ursache (Kapitel 5.3.1)

Aromatasehemmer (Kapitel 5.3.2)

Eine bestehende oder geplante Therapie mit Glukokortikoiden $\geq 2,5$ mg

Prednisolonäquivalent über mehr als 3 Monate (Kapitel 5.3.3)

Hochdosierte Glukokortikoide inhalativ (Kapitel 5.3.3)

Therapie mit Thiazolidindionen (Glitazonen) (Kapitel 5.3.4)

Medikamente, die Stürze begünstigen (Kapitel 5.3.5)

Antidepressiva (Kapitel 5.3.6)

Antiepileptika (Kapitel 5.2.4.1)

Opiode (Kapitel 5.3.8)

Protonenpumpenhemmer bei chronischer Einnahme (Kapitel 5.3.9)

DVO-Leitlinien 2017

Frauen ab dem 70. Lebensjahr, Männer ab dem 80. Lebensjahr:

Basisdiagnostik generell empfohlen, soweit eine Entscheidung über geplante therapeutische Maßnahmen ansteht

¹ sofern Risiko aktuell bestehend oder vor weniger als 12-24 Monaten beendet

DVO-Leitlinien 2017

TABELLE 3: DIE BASISDIAGNOSTIK BESTEHT AUS
(LANGFASSUNG KAPITEL 9)

A. Anamnese, Klinischer Befund
Hinweise für Wirbelkörperfrakturen? Erfassung von Lokalisation und Intensität Frakturbedingter Schmerzen und funktioneller Einschränkungen Hinweise für eine sekundäre Osteoporose oder ein Malignom? Beurteilung von Muskelkraft und Koordination bei Patienten ab dem 70. Lebensjahr oder mit Anhaltspunkten für eine Einschränkung, geriatrisches Assessment (B)
B. Osteodensitometrie zur Optimierung der Frakturrisikobeurteilung und Prüfung der Indikation für eine medikamentöse Therapie. Standardverfahren DXA (LWS, Gesamtfemur, Femurhals)
C. Ggf. Röntgen/ andere Bildgebung bei klinischen Hinweisen zur Erfassung von Wirbelkörperfrakturen Cave: Frische Wirbelkörperbrüche sind in der Frühphase röntgenologisch oft nicht eindeutig nachweisbar (B).
D. Labor zur Erfassung laborchemisch fassbarer Risikofaktoren und sekundärer Osteoporosen, differentialdiagnostisch in Frage kommender anderer Osteopathien und von Kontraindikationen für eine medikamentöse Therapie (B)
Serumkalzium, Serumphosphat, (Serumnatrium fakultativ)
Kreatinin-Clearance
Alkalische Phosphatase, Gamma-GT
Blutbild, BSG / CRP, (Serumeiweißelektrophorese evtl. mit Immunfixation optional)
TSH
25-Hydroxyvitamin D3 als Einzelfallentscheidung (B), Testosteron bei Männern fakultativ (B), Knochenumbau-Marker als Einzelfallentscheidung Kalziumausscheidung im 24-h-Urin bei V.a. idiopathische Hyperkalziurie (0) Kadmiumbestimmung im Urin bei V.a. erhöhte Kadmiumexposition (0)

DVO-Leitlinien 2017

DXA Knochendichtmessung

DXA Scan Information:

Scan: 5/21/03 - A06210196
Scan Mode: Fast Array
Analysis: 6/21/03 14:04 - Ver 8.26
Operator: SJ
Model: Hologic QDR-4500W (SN 40328)
Comment: lvs

Results Summary:

Total BMD:	0,860 g/cm ²	T score:	-1,7				
Peak reference:	82%	Z score:	-1,6				
Age-adjusted:	83%						
Regions:	Area (cm ²)	BMC (g)	BMD (g/cm ³)	T score	%PR	Z score	%AM
L1:	19,67	3,81	0,875	-0,9	89%	-0,8	91%
L2:	13,07	10,95	0,838	-1,7	81%	-1,6	83%
L3:	14,89	12,25	0,898	-1,8	82%	-1,6	83%
L4:	17,21	15,02	0,873	-2,2	76%	-2,1	79%
Total:	55,83	47,99	0,860	-1,7	82%	-1,6	83%

Fracture Risk
 No Increased
 Increased
 High
* WHO 1994

WHO Classification*
 Normal
 Osteopenia
 Osteoporosis

Reference Curve: TX, 4 November 91
Age and Sex Matched

TABELLE 4.1.: GENERALE INDIKATION FÜR EINE MEDIKAMENTÖSE OSTEOPOROSETHERAPIE

(vergleiche Tabelle 4.2 und LANGFASSUNG KAPITEL 10)

1. Niedrigtraumatische singuläre Wirbelkörperfraktur 2. oder 3. Grades oder multiple Wirbelkörperfrakturen 1. bis 3. Grades, wenn andere Ursachen nicht wahrscheinlicher sind, bei einem DXA T-Score < -2,0 an der LWS¹ oder dem Schenkelhals oder dem Gesamtfemur, individuell auch bei einem T-Score > -2,0

2. Niedrigtraumatische proximale Femurfraktur bei einem DXA T-Score < -2.0 an der LWS oder dem Schenkelhals oder dem Gesamtfemur, individuell auch bei einem T-Score > -2.0

Bei typischen osteoporotischen radiologischen und/oder klinischen Aspekten von Wirbelkörperfrakturen bzw. proximalen Femurfrakturen kann in Abhängigkeit von der klinischen Gesamtsituation auf eine Knochendichtemessung verzichtet werden.

3. Bestehende oder geplante Therapie mit oralen Glukokortikoiden 7.5 mg Prednisolonäquivalent täglich für > 3 Monate, wenn T-Score < -1.5 an der LWS oder dem Schenkelhals oder dem Gesamtfemur (individuell auch bei T-Score > -1.5) oder niedrig-traumatische Wirbelkörperfrakturen oder multiple periphere Frakturen (Ein endogenes Cushing-Syndrom ist äquivalent zu bewerten)

¹ Mittlerer T-Score der messbaren Wirbel L1-L4

Osteoporose – Therapieprinzipien

Osteoporose – spezielle Therapie

TABELLE 4.2.: INDIKATION FÜR EINE MEDIKAMENTÖSE OSTEOPOROSETHERAPIE NACH RISIKOPROFIL in Abhängigkeit von Geschlecht, Lebensalter, DXA-Knochendichte und weiteren Risikofaktoren. 1

Lebensalter in Jahren		T-Score (Nur anwendbar auf DXA-Werte. Die Wirksamkeit einer medikamentösen Therapie ist für periphere Frakturen bei einem T-Score > -2,0 nicht sicher belegt.)				
Frau	Mann ²	-2,0 bis -2,5	-2,5 bis -3,0	-3,0 bis -3,5	-3,5 bis -4,0	< -4, 0
50-60	60-70	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
60-65	70-75	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
65-70	75-80	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
70-75	80-85	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
>75	>85	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

¹ Alternative Risikomodelierungen können bei Bedarf vergleichend zu Rate gezogen werden (siehe Langfassung).

² bei Verwendung eines männlichen Referenzkollektivs für die T-Scores

Ethnizität FRAX

FRAX - WHO Fracture Risk Assessment Tool - MacOsX Firefox

http://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.jsp?country=de

FRAX - WHO Fracture Risk Assessment Tool

HOME CALCULATION TOOL PAPER CHARTS FAQ REFERENCES Select a Language

Calculation Tool

Please answer the questions below to calculate the ten year probability of fracture with BMD.

Country: **Germany** Name / ID: About the risk factors

Questionnaire:

1. Age (between 40-90 years) or Date of birth: Age: V: M: D:

2. Sex: Male Female

3. Weight (kg):

4. Height (cm):

5. Previous fracture: No Yes

6. Parent fractured hip: No Yes

7. Current smoking: No Yes

8. Glucocorticoids: No Yes

10. Secondary osteoporosis: No Yes

11. Alcohol 3 or more units per day: No Yes

12. Femoral neck BMD (g/cm²): Select DXA:

Clear Calculate

Ethnizität – FRAX

Country: Germany Name / ID: Test About the risk factors ⓘ

Questionnaire:

1. Age (between 40-90 years) or Date of birth
Age: 61 Y: M: D:

2. Sex Male Female

3. Weight (kg) 75

4. Height (cm) 165

5. Previous fracture No Yes

6. Parent fractured hip No Yes

7. Current smoking No Yes

8. Glucocorticoids No Yes

9. Rheumatoid arthritis No Yes

10. Secondary osteoporosis No Yes

11. Alcohol 3 or more units per day No Yes

12. Femoral neck BMD (g/cm²)
T-Score -3.1

Clear Calculate

BMI 27.5
The ten year probability of fracture (%)

with BMD	
■ Major osteoporotic	24
■ Hip fracture	12

Country: Turkey Name / ID: Test About the risk factors ⓘ

Questionnaire:

1. Age (between 40-90 years) or Date of birth
Age: 61 Y: M: D:

2. Sex Male Female

3. Weight (kg) 75

4. Height (cm) 165

5. Previous fracture No Yes

6. Parent fractured hip No Yes

7. Current smoking No Yes

8. Glucocorticoids No Yes

9. Rheumatoid arthritis No Yes

10. Secondary osteoporosis No Yes

11. Alcohol 3 or more units per day No Yes

12. Femoral neck BMD (g/cm²)
T-Score -3.1

Clear Calculate

BMI 27.5
The ten year probability of fracture (%)

with BMD	
■ Major osteoporotic	5.8
■ Hip fracture	2.7

Osteoporose – Therapie

TABELLE 6: MEDIKAMENTÖSE THERAPIE DER OSTEOPOROSE

(LANGFASSUNG KAPITEL 10.5)

Die spezifische Zulassung des Medikaments für die jeweiligen Indikationen und Kontraindikationen sind zu beachten. Grundlage hierfür sind die jeweils aktuellen Fachinformationen.

Bei Patienten mit parenteraler antiresorptiver Therapie Sicherstellung von täglicher Zufuhr von mindestens 1.000 mg Kalzium und ausreichende Versorgung mit Vitamin D3 (800-1.000 I.E.) (A).

Für die spezifische Therapie soll ein Präparat mit hoher Empfehlungsstärke verwendet werden (s. Tabelle) (A).

Für die individuelle Auswahl der Medikamente sollen die möglichen Neben- und Zusatzwirkungen (Kap 10.5.4 Langfassung), Kontraindikationen, die Kosten und die Einnahmemodalität berücksichtigt werden (A).

Bei **postmenopausalen Frauen**, die primär wegen vasomotorischer Symptome mit Östrogenen therapiert werden, ist mit Ausnahme sehr niedrig dosierter Präparate in der Regel keine weitere spezifische Osteoporose-Therapie erforderlich. Wird aufgrund von postmenopausalen Beschwerden Tibolon eingenommen, ist auch hierdurch eine Senkung des Frakturrisikos zu erwarten.

Osteoporose – Therapie

Belegte Wirksamkeit bei Frauen (für Männer generell geringere Evidenzlevel)	Weniger Wirbelkörper-Frakturen	Weniger periphere	Weniger proximale Femurfrakturen
Alendronat	A	A	A
Bazedoxifen	A	B	-
Denosumab	A	A	A
Ibandronat	A	B	-
Raloxifen	A	-	-
Risedronat	A	A	A
Zoledronat**	A	A	A
Teriparatid*, °	A	B	-
Östrogene*	A	A	A

* Besondere Einschränkungen bei Zulassung und Erstattungsfähigkeit beachten** Nach proximaler Femurfraktur Verabreichung nach Zeitintervall von 2 Wochen (A), Reduktion der Mortalität nach Femurfraktur
 ° Effektivere Frakturreduktion gegenüber oralen Bisphosphonaten in Bezug auf Wirbelkörperfrakturen
 Für die Osteoporosetherapie beim **Mann** sind Alendronat (10 mg tgl.), Risedronat (35 mg wöchentlich), Zoledronat **, Teriparatid und Denosumab zugelassen.

Osteoporose – Zusammenfassung

- Osteoporose ist in Deutschland unterdiagnostiziert und untertherapiert
- Folgen: erhöhte Morbidität und Mortalität
- „Case finding“ und Erkennung von Grunderkrankungen wichtig
- Basisdiagnostik bestehend aus Anamnese, Labor, DXA, Röntgen/Frakturassessment mittels DXA
- Allgemeinmaßnahmen für die Therapie essentiell
- Ca/Vit. D und Bisphosphonate oral oder i.v. Standardtherapie

Primärer Hyperparathyreoidismus

Kasuistik

- 57-jährige Patientin
- **Labor:** geringe Hypercalciämie 2,61mmol/l (in der Rückschau seit Jahren), PTH 71 pg/ml (15-65)
- **Klinik:** Keine Beschwerden, keine Nephrolithiasis, keine Osteoporose

... in der Endokrinologie

5. Jede unklare Hyperkalzämie soll abgeklärt werden.

Positiv-Empfehlungen

pHPT – Labor

NSD-Adenom Sonografie

pHPT – für wen OP?

- A. Surgery to be recommended if one of the following is present:**
1. Serum calcium >1 mg/dL (0.25 mmol/L) above upper limit of normal
 2. Skeletal features:
 - a. Fracture by VFA or vertebral X-ray
or
 - b. BMD by T-score ≤ -2.5 at any site
or
 3. Renal features:
 - a. eGFR or CrCl <60 cc/minute
or
 - b. Nephrocalcinosis or nephrolithiasis on X-ray, ultrasound, or other imaging modality
 - c. Urinary calcium excretion >250 mg/day (women) or >300 mg/day (men).*
 4. Age < 50

Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 37, No. 11, November 2022, pp 2391–2403.

pHPT – für wen OP?

B. Surgery to be recommended if one of the following occurs in follow-up*

1. Serum calcium consistently is measured >1 mg/dL (0.25 mmol/L) above upper limit of normal
2. Fracture
3. Kidney stone
4. Significant reduction in BMD to a T-score of ≤ -2.5 .
5. Significant reduction in CrCl**

* Represents a change from prior international workshop guidelines,⁽¹⁾

** For monitoring of renal function, the calculated CrCl is preferred over the estimate of eGFR.⁽¹³⁷⁾ Worsening kidney function that is thought to be clinically meaningful (e.g., a verified annual decline of 3 mL/min over several years to below 60 cc/min).

Abbreviations: CrCl, creatinine clearance; eGFR, estimated glomerular filtration rate; pHPT, primary hyperparathyroidism.

Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 37, No. 11, November 2022, pp 2391–2403.

pHPT – ohne OP

A. In patients who are not going to have surgery, the following nonsurgical approaches are reasonable:

1. Calcium intake should be consistent with nutritional guidelines.
2. Vitamin D should be maintained at >30 ng/mL and $<$ the laboratory reference range for upper limit of normal. Replacement should be cautious to prevent further increases in serum calcium concentration.
3. When clinically indicated, to reduce serum calcium, cinacalcet is effective.
4. When clinically indicated, to increase BMD, bisphosphonates or denosumab can be used.
5. When clinically indicated, to lower serum calcium and increase BMD, bisphosphonates or denosumab *and* cinacalcet can be used.

Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 37, No. 11, November 2022, pp 2391–2403.

B. Monitoring for those who are not to undergo PTX

In patients not undergoing parathyroid surgery, we recommend monitoring as follows:

1. Serum calcium and 25-OH-D concentrations: annually
2. Skeletal:
 - a. Three-site DXA every 1 or 2 years
 - b. Vertebral X-ray, VFA, or TBS if clinically indicated
3. Renal:
 - a. CrCl (a creatinine clearance is preferred over eGFR), annually
 - b. Abdominal imaging (X-ray, CT, or ultrasound) if clinically indicated

Abbreviations: eGFR, estimated glomerular filtration rate; PTX, parathyroidectomy; TBS, trabecular bone score; VFA, vertebral fracture assessment.

- 57-jährige Patientin
- **Labor:** geringe Hypercalciämie 2,61mmol/l (in der Rückschau seit Jahren), PTH 71 pg/ml (15–65)
- **Klinik:** Keine Beschwerden, keine Nephrolithiasis, keine Osteoporose
- **Befunde:** DXA T-Score Femur -1,9, Ca-Ausscheidung 24h Urin 190mg/d, Sonografie Nieren: keine Nephrolithiasis
- **Diagnose.** Asymptomatischer primärer Hyperparathyreoidismus
- **Therapie:** konservativ, Kontrolle alle 6–12 Monate